

レジメン一覧					2021/11/11 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
10	Rituximab 100mg/body	リツキマブ投与開始30分前に、ロキソニンNa60mg1錠とロキソニン5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：90mL Day1 リツキマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：100mg Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1
11	Rituximab 400mg/body	リツキマブ投与開始30分前に、ロキソニンNa60mg1錠とロキソニン5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 生食（500mL）：360mL Day1 リツキマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：400mg Day1
12	Rituximab 500mg/body	リツキマブ投与開始30分前に、ロキソニンNa60mg1錠とロキソニン5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 生食（500mL）：450mL Day1 リツキマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：500mg Day1
13	Rituximab 600mg/body	リツキマブ投与開始30分前に、ロキソニンNa60mg1錠とロキソニン5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 生食（500mL）：500mL Day1 生食（20mL）：40mL Day1 リツキマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：600mg Day1

14	Rituximab 700mg/body	リツキサンの投与開始30分前に、コルチコステロイド Na60mg1錠と和ハ°タジ°ン5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）:1瓶 Day1 生食（100mL）:90mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）:100mg Day1 生食（500mL）:500mL Day1 生食（20mL）:40mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）:600mg Day1
15	Rituximab 800mg/body	リツキサンの投与開始30分前に、コルチコステロイド Na60mg1錠と和ハ°タジ°ン5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）:1瓶 Day1 生食（200mL瓶）:180mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）:200mg Day1 生食（500mL）:500mL Day1 生食（20mL）:40mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）:600mg Day1
16	CHOP	day1～5にプレドニソン100mg/日内服を併用。ア°ビ°タト併用は主治医判断。投与間隔は3週毎。	1	19	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オンコピン注射用1mg:1.4mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:750mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液（500mL）:1袋 Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1 ドキシソルビシン塩酸塩注射用（規格なし）:50mg/m ² Day1

17	Bi-Weekly CHOP	day1~5にプレドニ100mg/日内服を併用。アブタ併用は主治医判断。投与間隔は2週毎。G-CSFによるフォロー必要	1	12	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オンコピン注射用 1mg:1.4mg/m² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:750mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 生食 (100mL):1瓶 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (規格なし):50mg/m² Day1</p>
19	CCD		3	18	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当):5瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トー」 (規格なし):25mg/m² Day1 Day2 Day3 生食 (500mL):1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし):250mg/m² Day1</p>
20	CMD		3	18	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当):5瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 Day2 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トー」 (規格なし):25mg/m² Day1 Day2 大塚生食注(250mL):1袋 Day3 ノバントロン注10mg (5mL瓶):8mg/m² Day3</p>

21	Bendamustine		2	<p>19 生食（100mL）:1瓶 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）:2管 Day1 Day2 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day2 トレアキシン点滴静注液100mg（4mL瓶）:120mg/m² Day1 Day2</p>
22	ABVD	主治医判断でア°ルビ°タト（day1~3, 15~17）併用。	15	<p>13 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day15 生食（100mL）:1瓶 Day1 Day15 プレオ注射用（規格なし）:10mg/m² Day1 Day15 生理食塩液〔ヒカリ〕50mL:1瓶 Day1 Day15 エクザール注射用10mg:6mg/m² Day1 Day15 ドキソルビシン塩酸塩注射用（規格なし）:25mg/m² Day1 Day15 ソルデム3A輸液（500mL）:1袋 Day1 Day15 生食（500mL）:1瓶 Day1 Day15 注射用水（20mL管）:2管 Day1 Day15 ダカルバジン注用100:375mg/m² Day1 Day15</p>

23	AMP		1	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :30m g /m² Day1 注射用サイメリン 5 0 mg:60m g /m² Day1 水溶性プレドニン (規格なし) :40m g /m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1</p>
24	EPOCH	day1~5のプレドニン (60mg/m ²) 経口併用可。	5	16	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day5 Day1 Day2 Day3 Day4 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day5 注射用エンドキサン 5 0 0 mg:750m g /m² Day5 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 オンコビン注射用 1 mg:0.4m g /m² Day1 Day2 Day3 Day4 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :10m g /m² Day1 Day2 Day3 Day4 エトポシド点滴静注液100mg「サント」 (5mL瓶) :50m g /m² Day1 Day2 Day3 Day4</p>

25	VECP	day2, 3のプレドニンは経口投与。	3	<p>25</p> <p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 注射用フィルデシン(規格なし):2.4mg/m² Day1 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/m² Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):250mg/m² Day1 水溶性プレドニン50mg:50mg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3</p>
26	VCAP-AMP-VECP	day2~6, 9~13, 18~27にG-CSF投与。day16, 17のプレドニンは経口投与。	17	<p>11</p> <p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 生食(1000mL):1瓶 Day1 Day8 オンコビン注射用1mg:1mg/m² Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用(規格なし):40mg/m² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:350mg/m² Day1 水溶性プレドニン(規格なし):40mg/m² Day1 Day8 Day15 ドキシルピシン塩酸塩注射用(規格なし):30mg/m² Day8 注射用サイメリン50mg:60mg/m² Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day15 Day16 Day17 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day15 注射用フィルデシン(規格なし):2.4mg/m² Day15 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day15 Day16 Day17 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/m² Day15 Day16 Day17 生食(500mL):1瓶 Day15 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):250mg/m² Day15</p>

27	MPV	塩酸プロカルバジン（100mg/m ² /dayを2-3分割）は、MTX投与前日から7日間内服、ただし奇数サイクルのみ	5	8	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 ロイコリン注3mg（1mL管）:15m g/m² Day2 Day4 Day5 Day3 生食（500mL瓶）:1瓶 Day1 メソトレキセート点滴静注液200mg（8mL瓶）:3500m g/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」（50mL瓶）:1瓶 Day1 オンコピン注射用1mg/瓶:1.4m g/m² Day1</p>
48	GDP		8	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day8 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:5瓶 Day1 Day2 Day3 生食（500mL）:1瓶 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注（規格なし）:25m g/m² Day1 Day2 Day3 生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）:1000m g/m² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day8</p>
49	DeVIC	放射線療法と同時に実施する場合は、2/3量に減量。	3	18	<p>生食（500mL瓶）:1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:5瓶 Day1 Day2 Day3 生食（100mL）:1瓶 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注400mg:1管 Day1 Day2 Day3 生食（500mL）:1瓶 Day1 Day2 Day3 イホマイド1g〔注射用〕:1.5g/m² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液（5%500mL）:1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」（ラステット）:100m g/m² Day1 Day2 Day3 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:300m g/m² Day1</p>

50	MINE		3	18	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1 Day2 Day3 ノバントロン注10mg（5mL瓶）：8mg/m² Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注400mg：1管 Day1 Day2 Day3 生食（500mL）：1瓶 Day1 Day2 Day3 イホマイド1g〔注射用〕：1.33g/m² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液5%（500mL袋）：1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」（ラステット）：65mg/m² Day1 Day2 Day3</p>
51	THP-COP	プロトニン30mg/m ² /日を3～5日間経口投与。	1	19	<p>大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 オンコピン注射用1mg：1mg/m² Day1 ブドウ糖注射液（5%100mL）：1瓶 Day1 注射用テラルピシン（規格なし）：30mg/m² Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg：500mg/m² Day1</p>
52	Gemcitabine		15	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg（リ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day8 Day15 生食（100mL）：1瓶 Day8 Day15 ギムシタビン点滴静注液（規格なし）：1000mg/m² Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day8 Day15</p>

53	CHASE	イントロ開始6時間前～終了24時間後までメイトを含む80mL/時以上の補液が必要。	3	18	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :5瓶 Day1 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 注射用エンドキサン500mg:1200mg/m² Day1 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット) :100mg/m² Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL):1袋 Day2 Day3 キロサイドN注400mg:2000mg/m² Day2 Day3</p>
54	DHAP		4	17	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :25mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注(250mL):1袋 Day2 キロサイドN注400mg:2000mg/m² Day2 ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa注射用100mg「武田レバ」:1瓶 Day2</p>
55	ESHAP		5	23	<p>生食 (1000mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソル・メドロール静注用500mg (溶解液8mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :25mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット) :40mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注(250mL):1袋 Day5 キロサイドN注400mg:2000mg/m² Day5</p>

56	MTX大量		5	9	<p>生食（500mL）：1瓶 Day1 メソトレキセート点滴静注液200mg（8mL瓶）：3500mg/m² Day1 ロイコボリン注3mg（1mL）：15mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1</p>
58	CPT-11	1週毎に2～3回繰り返し、少なくとも2週間休薬する。	3	4	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 Day2 Day3 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トワ」(規格なし)：40mg/m² Day1 Day2 Day3</p>
59	M-FEPA	MTXの投与に際して、Ccr 60mL/min以上であることを確認。	3	4	<p>ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3 メイロン（7%20mL）：1管 Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 生食（20mL）：1管 Day1 注射用メソトレキセート50mg：100mg/m² Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 注射用メソトレキセート50mg：300mg/m² Day1 ロイコボリン注3mg（1mL）：5管 Day2 Day3</p>

60	大量Ara-C (PCNSL)	2コースの地固め療法として行う。	2	26	生食 (500mL瓶) :1瓶 Day2 Day1 キロサイドN注400mg:3000mg/m ² Day2 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 Day2
64	Pralatrexate	投与10日以上前から葉酸 1.0~1.25mg 内服、VB12 1mg 筋注。週1回投与を6週連続で行い、7週目は休薬する。	15	6	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ジフォルタ注射液20mg (1mL瓶) :30mg/m ² Day1 Day8 Day15
66	Obinutuzumab + Bendamustine (初回)	ガザバ 投与開始30分前に、加ナル500mg2錠とビタミン10mg5錠内服。6コース終了後、維持療法を行う。	15	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day3 Day2 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用40mg (溶解液1mL) :2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day8 Day15 Day3 Day2 ガザバ点滴静注1000mg (1000mg/40mL) :1瓶 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day3 Day2 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day3 Day2 トリアキシン点滴静注液100mg (4mL瓶) :90mg/m ² Day3 Day2
67	Obinutuzumab + Bendamustine (2回目以降)	ガザバ 投与開始30分前に、加ナル500mg2錠とビタミン10mg5錠内服。6コース終了後、維持療法を行う。	3	25	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day3 Day2 ソル・メドロール静注用40mg (溶解液1mL) :2瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day3 Day2 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day3 Day2 大塚生食注(250mL):1袋 Day3 Day1 Day2 トリアキシン点滴静注液100mg (4mL瓶) :90mg/m ² Day3 Day2 ガザバ点滴静注1000mg (1000mg/40mL) :1瓶 Day1

68	Obinutuzumab (維持)	ガザイバ投与開始30分前に、カナル500mg2錠とレスタミン10mg5錠内服。維持療法は2ヶ月毎に2年間行う。	1	55	生食 (100mL) :1瓶 Day1 ソル・メドロール静注用40mg (溶解液1mL) :2瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg/40mL) :1瓶 Day1
57-1	Brentuximab Vedotin (<50mg)	アドセトリスの投与量によってレジメンを選択する。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1 注射用水 (20mL管) :1管 Day1 アドセトリス点滴静注用50mg:1.8mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1
57-2	Brentuximab Vedotin (≥50mg)	アドセトリスの投与量によってレジメンを選択する。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 注射用水 (20mL管) :2管 Day1 アドセトリス点滴静注用50mg:1.8mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1

79-1	BV+AVd (BV < 50mg)	アプロタクト (day1~3, 15~17) は主治医判断。最大6コース。アトセトリスの投与量によってレジメを選択する。	15	13	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day15 エクザール注射用10mg :6mg/m² Day1 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day15 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :25mg/m² Day1 Day15 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day15 注射用水 (20mL管) :3管 Day1 Day15 ダカルバジン注用100 :250mg/m² Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1 注射用水 (20mL管) :1管 Day1 アドセトリス点滴静注用50mg/瓶:1.2mg/kg Day1 Day15 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day15 注射用水 (20mL管) :2管 Day15</p>
79-2	BV+AVd (BV ≥ 50mg)	アプロタクト (day1~3, 15~17) は主治医判断。最大6コース。アトセトリスの投与量によってレジメを選択する。	15	13	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day15 エクザール注射用10mg :6mg/m² Day1 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day15 ドキソルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :25mg/m² Day1 Day15 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day15 注射用水 (20mL管) :3管 Day1 Day15 ダカルバジン注用100 :250mg/m² Day1 Day15 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day15 注射用水 (20mL管) :2管 Day1 Day15 アドセトリス点滴静注用50mg/瓶:1.2mg/kg Day1 Day15</p>

34	ALL-97変法	day1~7のフルトニン (60mg/m ²) は経口投与。	22	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 注射用エンドキサン500mg:800mg/m² Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8 Day15 Day22 ダウノマイシン (20mg) :30mg/m² Day1 Day2 Day3 オンコピン注射用 1mg:1.3mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22</p>
35	MAVP (地固め療法)	day2~4のフルトニン (60mg/m ²) は経口投与。	4	24	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 生食 (500mL) :1瓶 Day1 注射用メソトレキセート (規格なし) :500mg/m² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day2 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :45mg/m² Day2 オンコピン注射用 1mg:1.3mg/m² Day2 生食 (20mL) :1管 Day2 Day3 Day4 ロイコボリン注 3mg (1mL) :15mg/m² Day2 Day3 Day4</p>
78	Ph+ALL208IMA 寛解導入療法	day1-21 PSL 60mg/m ² 、day8-42 Imatinib 600mg。アプロピタト。60歳以上 : CY 800mg/m ² ,DNR 30mg/m ² ,PSL day1-7	22	20	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」500mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day3 オンコピン注射用 1mg:1.3mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 ダウノマイシン静注用20mg/瓶:60mg/m² Day1 Day2 Day3 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 注射用エンドキサン500mg:1200mg/m² Day1</p>

80	Ph+ALL208IMA 地固め療法 C1	day1 MTX+Ara-C+DEX 髄注。 day4-21 Imatinib 600mg。アゾピタ ント、ステロイド点眼要。60歳以上：Ara-C 1,000mg/m ²	4	24	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食（500mL瓶）:1瓶 Day2 Day3 Day1 キロサイドN注400mg（20mL管）:2000mg g/m ² Day2 Day3 生食（100mL瓶）:1瓶 Day1 Day2 Day3 ソル・メドロール静注用40mg（溶解液1mL）:50mg g Day1 Day2 Day3 ロイコボリン注3mg（1mL管）:15mg g Day3 Day4 Day2 メソトレキセート点滴静注液200mg（8mL瓶）:900mg g/m ² Day1 メソトレキセート点滴静注液200mg（8mL瓶）:100mg g/m ² Day1
81	Ph+ALL208IMA 地固め療法 C2	day1 MTX+Ara-C+DEX 髄注。 day1-7 PSL 60mg/m ² 、day2-21 Imatinib 600mg。アゾピタ ント。C1→ C2 を4回繰り返す	1	27	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オンコビン注射用1mg:1.3mg g/m ² Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1 ダウノマイシン静注用20mg/瓶:60mg g/m ² Day1 生食（500mL瓶）:1瓶 Day1 注射用エンドキサソ 500mg:1200mg g/m ² Day1
82	Ph+ALL208IMA 維持療法	day1-5 PSL 60mg/m ² 、day1-28 Imatinib 600mg。寛解到達後2年 目まで4週ごとに継続する。	1	27	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オンコビン注射用1mg:1.3mg g/m ² Day1 生食（100mL瓶）:1瓶 Day1

28	DA (寛解導入療法)	アピタト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	7	21	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ダウマイシン (20mg) :50mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 キロサイド注 (規格なし) :100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>
29	MA (地固め療法)		5	23	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day4 Day5 Day1 Day2 Day3 キロサイド注 (規格なし) :200mg/m² Day4 Day5 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 ノバントロン注10mg (5mL瓶) :7mg/m² Day1 Day2 Day3</p>
30	DA (地固め療法)	アピタト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	5	23	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 ダウマイシン (20mg) :50mg/m² Day1 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3 キロサイド注 (規格なし) :200mg/m² Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p>

31	AA (地固め療法)	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	5	23	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注 (規格なし) :200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アクラシノン注射用20mg:20mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
32	AVVV (地固め療法)	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	10	18	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注 (規格なし) :200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注射液5% (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトボシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット) :100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (20mL) :1管 Day8 Day10 オンコピン注射用1mg:0.8mg/m² Day8 注射用フィルデシン (規格なし) :2mg/m² Day10</p>
33	CAG	day1~28にG-CSF投与。65歳以上はアクラシノン10mg/m ² 。	14	14	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day5 Day6 Day7 Day8 Day10 Day11 Day9 Day12 Day13 Day14 Day2 Day3 Day4 キロサイド注 (規格なし) :20mg/m² Day1 Day5 Day6 Day7 Day8 Day10 Day11 Day9 Day12 Day13 Day14 Day2 Day3 Day4 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 アクラシノン注射用20mg:14mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4</p>

65	IDR+AraC	ア°比°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	5	16	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 注射用水 (20mL管) :1管 Day1 Day2 Day3 イダマイシン静注用5mg/瓶:12m g /m Day1 Day2 Day3 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注 (規格なし) :140m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
38	(SC) Azacitidine (day1~7)		7	21	<p>注射用水 (2 0 m L) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 ビダーザ注射用100mg:75m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>
39	(SC) Azacitidine (day1~5, 8~9)		9	19	<p>注射用水 (2 0 m L) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 ビダーザ注射用100mg:75m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9</p>
40	(DIV) Azacitidine (day1~7)		7	21	<p>生食 (2 0 mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 注射用水 (2 0 m L) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 ビダーザ注射用100mg:75m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>

41	(DIV) Azacitidine (day1~5, 8~9)		9	19	生食 (20 mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 生理食塩液「ヒカリ」50 mL :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 注射用水 (20 mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 ビダーザ注射用100mg:75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9
42	Mogamulizumab	必要により解熱鎮痛剤 (アセアミノフェン等) の前投与を行う。週1回 (化学療法併用の場合, 2週に1回) , 8回投与。	1	0	生食 (100 mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ポテリジオ点滴静注20mg:1mg/kg Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1
45	VCAP	day2~6にG-CSF投与。	1	6	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食 (100 mL) :1瓶 Day1 オンコビン注射用 1mg:1mg/m ² Day1 ドキソルビシン塩酸塩注射用 (規格なし) :40mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン 500mg:350mg/m ² Day1 水溶性プレドニン (規格なし) :40mg/m ² Day1

46	AMP	day2~6にG-CSF投与。	1	6	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用（規格なし）:30mg/m² Day1 注射用サイメリン50mg:60mg/m² Day1 水溶性プレドニン（規格なし）:40mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
47	VECP	day4~13にG-CSF投与。day2, 3のプレドニンは経口投与。	3	11	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」（50mL瓶）:1瓶 Day1 注射用フィルデシン（規格なし）:2.4mg/m² Day1 ブドウ糖注射液5%（500mL袋）:1袋 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」（ラステット）:100mg/m² Day1 Day2 Day3 生食（500mL）:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:250mg/m² Day1 水溶性プレドニン（規格なし）:40mg/m² Day1</p>
60	CDDP（10mg）+CPT-11（20mg）		3	1	<p>大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 Day2 Day3 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トリ」:20mg Day1 Day2 Day3 生食（500mL）:1瓶 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL:10mg Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食（100mL瓶）:1瓶 Day1 Day2 Day3</p>

63	CDDP (20mg) +CPT-11 (40mg)		3	1	<p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 イリテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「トール」:40mg Day1 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」20mL :20mg Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3</p>
36	(IV) Bortezomib±Dexamethasone	day2, 5, 9, 12は「カ」の 10mg/body経口投与。	11	10	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 Day4 Day8 Day11 生食 (20mL) :1管 Day1 Day4 Day8 Day11 ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/ml Day1 Day4 Day8 Day11</p>
37	(IV) Bortezomib (維持) ±Dexamethasone	day2, 9, 16, 23は「カ」の 10mg/body経口投与。	22	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 Day8 Day15 Day22 生食 (20mL) :1管 Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22</p>

43	(SC) Bortezomib±Dexamethasone	day2, 5, 9, 12は ^レ カ ^ク の 10mg/body経口投与。	11	10	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 Day4 Day8 Day11 生食 (20mL) :1管 Day1 Day4 Day8 Day11 ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/ml Day1 Day4 Day8 Day11
53	(SC) Bortezomib (維持)	副腎皮質ステロイド (レテックス等) を適宜併用。	22	13	生食 (20mL) :1管 Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22
61	Elotuzumab (1、2コース目)	加ナル500mg 1錠, スタミン10mg 3錠 内服。レアラミド、レテックス併用。	22	6	生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 Day22 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 大塚生食注(250mL):230mL Day1 Day8 Day15 Day22 注射用水 (20mL管) :2管 Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシティ点滴静注用400mg/瓶:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22

62	Elotuzumab (3コース目以降)	加ナル500mg 1錠, レスタミン10mg 3錠内服。レブテック併用。	15	13	<p>生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day15 大塚生食注(250mL):230mL Day1 Day15 注射用水(20mL管):2管 Day1 Day15 エムプリシティ点滴静注用400mg/瓶:10mg/kg Day1 Day15</p>
69	DLd (1, 2コース目)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠内服。レブテック 3週投与、1週休薬。	22	6	<p>生食(100mL瓶):1瓶 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管):5瓶 Day8 Day15 Day22 ポラミン注5mg (1mL管):1管 Day8 Day15 Day22 生食(500mL瓶):1瓶 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day8 Day15 Day22 テルモ生食(1000mL):1袋 Day1</p>
70	DLd (3~6コース目)	day1,15 加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠内服。レブテック 3週投与、1週休薬。day8,22 レブテック40mg内服。	15	13	<p>生食(100mL瓶):1瓶 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管):5瓶 Day15 ポラミン注5mg (1mL管):1管 Day15 生食(500mL瓶):1瓶 Day15 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day15</p>

71	DLd (7コース目~)	day1 加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠内服。レパラミド 3週投与、1週休業。day8,15,22 レパラミド40mg内服。	1	27	生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16mg/kg Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :5瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1
72	DMPB (1コース目)	ダラザレックス投与1-3時間前に、加ナル500mg 2T,モンテカスト10mg 1T。 day1-4 アルケラン 9mg/m ² ,day2-4 プレトニン 60mg/m ² 。	36	6	生食 (20mL管) :1管 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 ベルケイド注射用3mg/瓶:1.3mg/m ² Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day29 Day36 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16mg/kg Day29 Day36 Day8 Day15 Day22 テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day1
73	DMPB (2~9コース目)	ダラザレックス投与1-3時間前に、加ナル500mg 2T,モンテカスト10mg 1T。 day1-4 アルケラン 9mg/m ² ,day2-4 プレトニン 60mg/m ² 。	29	13	生食 (20mL管) :1管 Day8 Day22 Day29 Day1 ベルケイド注射用3mg/瓶:1.3mg/m ² Day8 Day22 Day29 Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day22 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day22 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day22 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day22 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day22 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16mg/kg Day1

74	DMPB (10コース目)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠 内服。	1	27	<p>生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g/kg Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1</p>
75	DBd (1~3コース目)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠 内服。 day2, 9 レナテックス 20mg 内服。	15	6	<p>生食 (20mL管) :1管 Day8 Day1 ベルケイド注射用3mg/瓶:1.3m g/m³ Day8 Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day8 Day15 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day8 Day15 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day8 Day15 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g/kg Day8 Day15 テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day1</p>
76	DBd (4~8コース目)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠 内服。 day2, 8, 9 レナテックス 20mg 内服。	8	13	<p>生食 (20mL管) :1管 Day8 Day1 ベルケイド注射用3mg/瓶:1.3m g/m³ Day8 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g/kg Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1</p>

77	DBd (9コース目～)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、カゲル500mg 2錠、モンテルカスト10mg 1錠 内服。	1	20	生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g/kg Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1
----	--------------	---	---	----	--