

| レジメン一覧 | | | | | 2021/11/11 時点 |
|--------|-----------------------|--|----------|----------|--|
| コード | レジメン名 | コメント | 投与 日数 | 休薬 期間 | 薬剤情報 薬品名：数量 投与日 |
| 10 | CBDCA+PTX | ビタミン5錠内服。 | 1 | 20 | 生食（100mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）：2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし)：180mg/m ² Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）：0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 |
| 11 | CBDCA+PTX+Bevacizumab | ビタミン5錠内服。アバスタブの投与時間は2回目60分，3回目以降30分に短縮可。 | 1 | 20 | 生食（100mL）：1瓶 Day1 アバスタブ点滴静注用(規格なし)：15mg/kg Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）：2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし)：180mg/m ² Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）：0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|----|----|---|
| 12 | Weekly PTX+ CBDCA + RT | <p>以テ5錠内服。治療終了後、引き続きPTX(200mg/m²) + CBDCA (AUC5) day1のみ投与を2コース施行。</p> | 36 | 6 | <p>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :40mg /m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg /A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> |
| 20 | CBDCA + PEM | <p>投与7日前にメトホルミル注1mg筋注 (3コース毎に1回程度) , 投与7日前よりパンビタン1g内服 (連日服用) 。</p> | 1 | 20 | <p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 ペメトレキセド点滴静注液「トール」 (規格なし) :500mg /m² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg /A Day1</p> |
| 21 | CBDCA + PEM + Bevacizumab | <p>投与7日前にメトホルミル注1mg筋注 (3コース毎に1回程度) , 投与7日前よりパンビタン1g内服 (連日服用) 。</p> | 1 | 20 | <p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 ペメトレキセド点滴静注液「トール」 (規格なし) :500mg /m² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg /A Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):15mg /kg Day1</p> |

| | | | | | |
|----|----------------|--|----|----|---|
| 30 | CBDCA + DOC | | 1 | 27 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」 (規格なし) :60mg/m² Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1</p> |
| 40 | CBDCA + GEM | | 8 | 13 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m² Day1 Day8 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8</p> |
| 50 | CBDCA + CPT-11 | | 15 | 13 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トール」 (規格なし) :50mg/m² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> |
| 60 | CBDCA + VNR | | 8 | 20 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 (規格なし) :20mg/m² Day1 Day8 生食 (100mL) :1瓶 Day8</p> |

| | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------------------|----|----|--|
| 70 | CBDCA + S1 | ティ-エソロンはday1~14経口投与（2週投与1週休薬）。 | 1 | 20 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p> |
| 80 | CBDCA + VP16 | | 3 | 25 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 生食（500mL瓶）:1瓶 Day1 Day2 Day3 イトポシド点滴静注液100mg「サンド」（ラステット）:100mg/m² Day1 Day2 Day3</p> |
| 90 | CBDCA + AMR | | 3 | 25 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 生食（20mL）:1管 Day1 Day2 Day3 カルセド注射用（規格なし）:35mg/m² Day1 Day2 Day3</p> |
| 100 | CBDCA + nab-PTX | | 15 | 13 | <p>パロセトンの点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ林村」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8 Day15 アプタキサン点滴静注用100mg:100mg/m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1</p> |

| | | | | | |
|-----|----------|--|---|----|--|
| 210 | CDDP+DOC | ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。 | 3 | 18 | <p>パ°レト°点滴静注ハ°ク°0.75mg/50mL「タ林」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ°酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リ°酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :60mg/m² Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg/m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1</p> |
| 220 | CDDP+PEM | ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用。投与7日前にメ°ル注1mg筋注, 投与7日前よりパ°タト1g内服 | 3 | 18 | <p>パ°レト°点滴静注ハ°ク°0.75mg/50mL「タ林」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ°酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リ°酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :75mg/m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :1袋 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 ペメトレキセド点滴静注「ト°」(規格なし) :500mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1</p> |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|---|----|--|
| 221 | CDDP+PEM (NSCLC) (ショートハイドレーション) | ア°ルビ°タツト(day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用。投与7日前にメチコパ°ル注1mg筋注, 投与7日前よりア°ルビ°タツト1g内服。 | 1 | 20 | <p>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 パ°ロセトロン点滴静注バ°ック° 0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :75m g /m² Day1 ペメトレキセド点滴静注液「ト°」 (規格なし) :500m g /m² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「ルE」 (10mL) :1キット Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1</p> |
| 230 | CDDP+GEM | ア°ルビ°タツト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。 | 8 | 13 | <p>グラニセトロン点滴静注液バ°ック° 1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day8 Day1 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000m g /m² Day8 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day8 パ°ロセトロン点滴静注バ°ック° 0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g /m² Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p> |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--|----|----|--|
| 240 | CDDP+CPT-11 (NSCLC) | ア°比°タ°ト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。 | 15 | 13 | <p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」 (規格なし) :60mg /m² Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day8 Day15 パ°ロ°セ°ト°ン°点°滴°静°注°ハ°ツ°カ° 0.75mg/50mL「タ°イ°ウ°」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg /m² Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p> |
| 241 | CDDP+CPT-11 (NSCLC放射線併用) | ア°比°タ°ト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。 | 15 | 13 | <p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」 (規格なし) :50mg /m² Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day8 Day15 パ°ロ°セ°ト°ン°点°滴°静°注°ハ°ツ°カ° 0.75mg/50mL「タ°イ°ウ°」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60mg /m² Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p> |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|--|----|----|---|
| 242 | CDDP+CPT-11 (SCLC) | ア°比°タ°ト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。 | 15 | 13 | <p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」 (規格なし) :60m g /m² Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day8 Day15 パ°ロ°セ°ト°ン°点°滴°静°注°バ°ッ°ク° 0.75mg/50mL「夕休切」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g /m² Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p> |
| 243 | CDDP+CPT-11 (SCLC放射線併用) | ア°比°タ°ト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。 | 15 | 13 | <p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」 (規格なし) :40m g /m² Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day8 Day15 パ°ロ°セ°ト°ン°点°滴°静°注°バ°ッ°ク° 0.75mg/50mL「夕休切」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g /m² Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p> |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|----|----|---|
| 244 | CDDP+CPT-11 (NSCLC) (ショートハイドレーション) | アピタント (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。食事等通常摂取 + 1000mL/dayの追加経口補給推奨 (day1~3) | 15 | 13 | <p> グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」 (規格なし) :60m g /m² Day8 Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day8 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 パロチロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g /m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :200m L Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1 Day15 ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「アル」 (10mL) :1キット Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day15 </p> |
|-----|------------------------------------|--|----|----|---|

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|----|--|
| 245 | CDDP+CPT-11 (SCLC) (ショートハイドレーション) | ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。食事等通常摂取 + 1000mL/dayの追加経口補給推奨 (day1~3) | 15 | <p>13</p> <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」 (規格なし) :60m g/m² Day8 Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day8 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 パ°ロ°セ°ト°ン°点°滴°静°注°バ°ッ°ク° 0.75mg/50mL「タ休ウ」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g/m² Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1 Day15 ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「カキ」 (10mL) :1キット Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day15</p> |
| 250 | CDDP+VNR | ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。 | 8 | <p>20</p> <p>生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day8 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day8 Day1 ロゼウス静注液 (規格なし) :25m g/m² Day8 Day1 パ°ロ°セ°ト°ン°点°滴°静°注°バ°ッ°ク° 0.75mg/50mL「タ休ウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g/m² Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p> |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|----|---|
| 260 | CDDP+S1（放射線同時併用） | ア°ビ°タト（day1：125mg，day2～3：80mg）併用。アイソンはday1～14経口投与（2週投与2週休薬）。 | 3 | 25 | <p>パロジト点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リソ酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注（規格なし）：60mg/m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：1袋 Day1 ソルデム3A輸液（500mL袋）：1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10mL Day1</p> |
| 261 | CDDP+S1（NSCLC）（ショートハイドレーション） | ア°ビ°タト（day8：125mg，day9,10：80mg）併用。アイソンはday1～21経口投与。追加経口摂取1000mL/day（day8～10） | 1 | 34 | <p>生食（100mL瓶）：1瓶 Day1 パロジト点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リソ酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 生食（500mL瓶）：1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注（規格なし）：60mg/m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：200mL Day1 大塚生食注（250mL）：1袋 Day1 ソルデム1輸液（500mL袋）：1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10mL Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「カレ」（10mL）：1キット Day1 生理食塩液「ヒカリ」（50mL瓶）：1瓶 Day1</p> |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|---|---|----|---|
| 270 | CDDP+VP16 (ショートハイドレーション) | アプロタクト(day1: 125mg, day2,3: 80mg)併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給の推奨 (day1~3) | 3 | 25 | <p>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 パロシト点静注バグ 0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 エトポシド点静注液100mg「サンド」 (5mL瓶) :100mg /m³ Day1 Day2 Day3 シスプラチン点静注 (規格なし) :80mg /m³ Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 (10mL) :1キット Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day2 Day3</p> |
| 271 | CDDP+VP-16 | アプロタクト (day1: 125mg, day2~3: 80mg) 併用。 | 3 | 18 | <p>パロシト点静注バグ 0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点静注 (規格なし) :80mg /m³ Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 エトポシド点静注液100mg「サド」 (5mL瓶) :100mg /m³ Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day2 Day3</p> |
| 610 | Nivolumab (q2w) | | 1 | 13 | <p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 オブジーボ点静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1</p> |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|----|---|
| 620 | Nivolumab (q4w) | | 1 | 27 | 生食 (100mL) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :2瓶 Day1 |
| 630 | Pembrolizumab (q3w) | | 1 | 20 | 生食 (100mL) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1 |
| 631 | Pembrolizumab+ CBDCA+PTX (導入) | ルート確保時、レスタミン5錠内服。アプレビタント (day1:125mg,day2,3:80mg) 併用。4コース後、維持 (Pembrolizumab) へ。 | 1 | 20 | グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :200mg/m ² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1 |
| 632 | Pembrolizumab+ CBDCA+PEM (導入) | マコパール注1mg筋注 (3コース毎に1回程度), パンビタン1g (連日服用)。アプレビタント併用。4コース後、維持 (Pembro+PEM) | 1 | 20 | 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 ペメトレキセド点滴静注液「トール」(規格なし) :500mg/m ² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|----|--|
| 633 | Pembrolizumab+PEM (維持) | 投与7日前にマコパール注1mg筋注(3コース毎に1回程度), 投与7日前よりペンビタン1g内服(連日服用)。 | 1 | 20 | 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ペメトレキセド点滴静注「トール」(規格なし):500mg/m ² Day1 |
| 640 | Pembrolizumab (q6w) | | 1 | 41 | 生食(100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):400mg Day1 |
| 650 | Atezolizumab | 初回60分かけて投与し, 忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。 | 1 | 20 | 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL):1200mg Day1 |
| 651 | Atezolizumab + Bevacizumab + CBDCA + PTX (| アバスチン終了後、イスタミン5錠内服。アスピリン(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。4-6コース終了後、維持(Atezo+Beva)。 | 1 | 20 | 生食(100mL):1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):200mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|----|----|---|
| 652 | Atezolizumab+Bevacizumab (維持) | | 1 | 20 | <p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 アバチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1</p> |
| 653 | Atezolizumab+CBDCA+VP-16 (導入) | ア°ビ°タト (day1:125mg,day2-3:80mg) 併用。4-J-終了後、維持 (Atezolizumab)。 | 3 | 18 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg「サト」 (5mL瓶) :100mg/m² Day1 Day2 Day3 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3</p> |
| 654 | Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX (導入) | ア°ビ°タト (day1:125mg,day2-3:80mg) 併用。4又は6-J-終了後、維持 (Atezolizumab)。 | 15 | 6 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg/瓶:100mg/m² Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1</p> |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|----|--|
| 655 | Atezolizumab+CBDCA+PEM (導入) | アテゾリズマブ1mg筋注(9週毎に1回), パントパミン1g(連日服用)。アプレピタクト 併用。4又は6コース後、維持 (Atezo+PEM)。 | 1 | 20 | グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ペムトレキセド点滴静注液「ト-7」(規格なし):500mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 |
| 656 | Atezolizumab+PEM (維持) | 投与7日前までにアテゾリズマブ1mg筋注 (9週毎に1回), 投与7日以上前より パントパミン1g内服(連日服用)。 | 1 | 20 | グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ペムトレキセド点滴静注液「ト-7」(規格なし):500mg/m ² Day1 |
| 670 | Durvalumab | | 1 | 13 | 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 |
| 410 | DOC | | 1 | 20 | グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):60mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 |
| 420 | PEM | 投与7日前にアテゾリズマブ1mg筋注(3 コース毎に1回程度), 投与7日前よりパ ントパミン1g内服(連日服用)。 | 1 | 20 | 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ペムトレキセド点滴静注液「ト-7」(規格なし):500mg/m ² Day1 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------------------------|----|----|--|
| 430 | GEM | | 15 | 13 | <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day15 Day8 生食(100mL):1瓶 Day1 Day15 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m² Day1 Day15 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day15 Day8</p> |
| 440 | Weekly CPT-11 | 1週間毎に3~4回投与し、少なくとも2週間休薬。 | 1 | 6 | <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」(規格なし):100mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p> |
| 450 | VNR | | 8 | 13 | <p>生食(100mL):1瓶 Day8 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day1 ロゼウス静注液(規格なし):25mg/m² Day8 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day8 Day1</p> |
| 460 | AMR | | 3 | 18 | <p>生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):20mL Day3 Day1 Day2 カルセド注射用(規格なし):45mg/m² Day3 Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day3 Day1 Day2 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3</p> |

| | | | | | |
|-----|--------------|-----------|----|----|---|
| 470 | Topotecan | | 5 | 16 | <p>生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生食 (100mL) : 1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 ハイカムチン注射用1.1mg : 1mg/m² Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> |
| 480 | CPT-11 + PTX | 以タミン5錠内服。 | 15 | 13 | <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トー」 (規格なし) : 50mg/m² Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day8 Day15 生食 (100mL) : 1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) : 2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管): 1管 Day1 生食 (500mL) : 1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」 (規格なし) : 180mg/m² Day1</p> |
| 490 | CPT-11 + GEM | | 8 | 13 | <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day8 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day8 Day1 大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day8 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トー」 (規格なし) : 100mg/m² Day8 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day8 Day1 生食 (100mL) : 1瓶 Day8 Day1 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) : 1000mg/m² Day8 Day1</p> |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|---------------------------------|---|----|--|
| 500 | GEM+VNR | | 8 | 13 | <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）:1000mg/m² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液（規格なし）:25mg/m² Day1 Day8</p> |
| 510 | Bevacizumab (maintenance) | アバスチンは2回目60分, 3回目以降30分に短縮可。 | 1 | 20 | <p>生食（100mL）:1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1</p> |
| 520 | nab-PTX (weekly) | | 1 | 6 | <p>生食（100mL）:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p> |
| 530 | DOC+ Ramucirumab | サイラムザの投与時間は初回60分, 2回目以降30分に短縮可。 | 1 | 20 | <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 ポラミン注 5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用（規格なし）:10mg/kg Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」（規格なし）:60mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p> |