

レジメン一覧					2021/11/11 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
310	Trastuzumab (初回)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :8m g/kg Day1
311	Trastuzumab (2回目以降)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :6m g/kg Day1
362	TC75 + Trastuzumab (初回)		1	20	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75m g/m ² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン 500mg:600m g/m ² Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :8m g/kg Day1
363	TC75 + Trastuzumab (2回目以降)		1	20	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75m g/m ² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン 500mg:600m g/m ² Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :6m g/kg Day1

372	DOC75 + Trastuzumab (初回)		1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75mg/m² Day1 注射用水 (20mL管) :0.38mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :8mg/kg Day1</p>
373	DOC75 + Trastuzumab (2回目以降)		1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75mg/m² Day1 注射用水 (20mL管) :0.285mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :6mg/kg Day1</p>
382	DOC75 + Trastuzumab + Pertuzumab (初回)		1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75mg/m² Day1 注射用水 (20mL管) :0.38mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :8mg/kg Day1 パーージェタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1</p>
383	DOC75 + Trastuzumab + Pertuzumab (2回目以降)		1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75mg/m² Day1 注射用水 (20mL管) :0.285mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :6mg/kg Day1 パーージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1</p>

384	Trastuzumab + Pertuzumab (初回)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :8m g/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1
385	Trastuzumab + Pertuzumab (2回目以降)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :6m g/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1
390	T-DM1 (Trastuzumab Emtansine)	初回90分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 カドサイラ点滴静注用 (規格なし) :3.6m g/kg Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1
400	T-DM1 (Trastuzumab Emtansine) (術後：上)	初回90分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。上限14コース。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 カドサイラ点滴静注用 (規格なし) :3.6m g/kg Day1
410	Trastuzumab deruxtecan	アプロピタト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。初回90分、忍容性がよければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	ブドウ糖注射液5% (100mL瓶) :1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 注射用水 (20mL管) :1管 Day1 インハーツ点滴静注用100mg:5.4m g/kg Day1

20	EC100	アピタト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パロセト点静注バツク 0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 塩酸エピルピシン注 (規格なし) :100mg/m² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:600mg/m² Day1</p>
21	EC60	アピタト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パロセト点静注バツク 0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 塩酸エピルピシン注 (規格なし) :60mg/m² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:600mg/m² Day1</p>
22	dose dense EC90	アピタト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	1	13	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パロセト点静注バツク 0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 塩酸エピルピシン注 (規格なし) :90mg/m² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:600mg/m² Day1</p>

40	Weekly PTX	以タミン5錠内服。	1	6	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし)：80mg/m² Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1</p>
41	Weekly PTX + Bevacizumab	以タミン5錠内服。アバスタチンの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	15	13	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 生食（100mL）：1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし)：80mg/m² Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 アバスタチン点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day15</p>
42	dose dense PTX	2週毎、4コース行う。フィルター付き輸液セットを使用する。以タミン5錠内服。	1	13	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食（500mL瓶）：1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし)：175mg/m² Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1</p>
61	DOC75		1	20	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし)：75mg/m² Day1</p>

70	VNR		8	13	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 (規格なし) :25m g /m² Day1 Day8</p>
80	GEM		8	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1250m g /m² Day1 Day8</p>
91	TC75 (Docetaxel + Cyclophosphamide)		1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」 (規格なし) :75m g /m² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン5 0 0 mg:600m g /m² Day1</p>
110	nab-PTX		1	20	<p>生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260m g /m² Day1</p>

120	Eriburin		8	13	<p>生理食塩液「ヒカリ」5.0mL:1瓶 Day1 Day8</p> <p>ハラヴェン静注1mg:1.4mg/mL Day1 Day8</p> <p>デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8</p>
130	Atezolizumab + nab-PTX	テセントリクは初回60分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。	15	13	<p>生食（100mL）:1瓶 Day1</p> <p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day15</p> <p>テセントリク点滴静注840mg（14mL瓶）:1瓶 Day1 Day15</p> <p>生理食塩液「ヒカリ」（50mL瓶）:1瓶 Day8 Day15</p> <p>生食（100mL瓶）:1瓶 Day8 Day15</p> <p>アブラキサン点滴静注用100mg/瓶:100mg/mL Day8 Day15</p>
140	Pembrolizumab + Weekly PTX	以テミン5錠内服。	71	13	<p>生食（100mL瓶）:1瓶 Day1 Day22 Day43 Day64</p> <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64</p> <p>デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64</p> <p>ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64</p> <p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64</p> <p>パクリタキセル注「ホスピール」（規格なし）:90mg/mL Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64</p> <p>生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8 Day22 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64</p> <p>キイトルーダ点滴静注100mg（100mg/4mL）:200mg Day1 Day22 Day43 Day64</p>