

レジメン一覧					2021/11/11 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
10	S1+CDDP	ティ-1スクは80mg/m <sup>2</sup> をday1～21経口投与（3週投与2週休薬）。アプロピタト（day8～10）併用。	3	32	ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液（500mL袋）：1袋 Day1 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイク」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注（規格なし）：60mg/m <sup>2</sup> Day1 20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10mL Day1
12	S1+DOC	ティ-1スクは80mg/m <sup>2</sup> をday1～14経口投与（2週投与1週休薬）。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」（規格なし）：40mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1
12.1	DOC		1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」（規格なし）：60mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1

15	Weekly PTX	以 <sup>レ</sup> タ <sup>ニ</sup> 5錠内服。	15	13	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15  生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15  パクリタキセル注「ネビ<sup>レ</sup>ラ」(規格なし):80mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15</p>
27	nab-PTX		1	20	<p>生食(100mL):1瓶 Day1  アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
42	CapeOX	カ <sup>レ</sup> シ <sup>レ</sup> ト <sup>ニ</sup> は2000mg/m <sup>2</sup> をday1の夕 <sup>ニ</sup> からday15の朝まで内服(2週投与1週休薬)。	1	20	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1  オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
43	SOX	オ <sup>シ</sup> タ <sup>ニ</sup> は80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与(2週投与1週休薬)。	1	20	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1  オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>

44	Weekly PTX + Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分, 2回目以降30分に短縮可。	15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15  ポラミン注 5mg:1管 Day1 Day8 Day15  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15  サイラムザ点滴静注用 (規格なし) :8mg/kg Day1 Day15  パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :80mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15  生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15</p>
45	Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分, 2回目以降30分に短縮可。	1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  ポラミン注 5mg:1管 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  サイラムザ点滴静注用 (規格なし) :8mg/kg Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1</p>
46	Weekly nab-PTX + Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分, 2回目以降30分に短縮可。	15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15  ポラミン注 5mg:1管 Day1 Day15  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day15  サイラムザ点滴静注用 (規格なし) :8mg/kg Day1 Day15  生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15  アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1 Day15</p>

53	mFOLFOX6		1	13	<p>パロリチン点滴静注パック0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-リ」(規格なし):200mg/m<sup>2</sup> Day1  オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1  フルオウラシル注1000mg「ト-リ」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食(100mL):1瓶 Day1  フルオウラシル注1000mg「ト-リ」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食シリンジ「テルモ」10mL(スリッパチップ):1筒 Day1</p>
48-1	Nivolumab (q2w)		1	13	<p>生食(100mL):1瓶 Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1  オプジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1</p>
48-2	Nivolumab (q4w)		1	27	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1  オプジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):2瓶 Day1  生食(100mL):1瓶 Day1</p>
20	Trastuzumab (初回)	胃癌に対しては、ハーセプチン単剤での投与不可(他の抗悪性腫瘍剤との併用が必要)。	1	20	<p>生食(100mL):1瓶 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1  トラスツズマブBS点滴静注用「ファイバー」(規格なし):8mg/kg Day1</p>

21	Trastuzumab (2回目以降)	胃癌に対しては、ハーセプチン単剤での投与不可（他の抗悪性腫瘍剤との併用が必要）。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水（20mL管）：0.285mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」（規格なし）：6mg/kg Day1
54	Trastuzumab deruxtecan	アプロピタは主治医判断。初回90分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	ブドウ糖注射液5%（100mL瓶）：1瓶 Day1 パロリセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タケダ」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 注射用水（20mL管）：1管 Day1 インハーツ点滴静注用100mg:6.4mg/kg Day1
29	CPT-11 + Trastuzumab (初回)	CPT-11は2週毎投与、Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水（20mL管）：0.38mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」（規格なし）：8mg/kg Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」（規格なし）：150mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1

30	CPT-11	2週毎投与。	1	0	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」 (規格なし) :150mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1</p>
31	Trastuzumab (2回目以降)	3週毎投与。	1	0	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.285mL/kg Day1  トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :6mg/kg Day1</p>

32	CPT-11 + Trastuzumab (2回目以降)	CPT-11は2週毎投与, Trastuzumabは3週毎投与。	1	<p>0</p> <p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1  トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :6m g/kg Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トー」 (規格なし) :150m g/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」 5 0 m L :1瓶 Day1</p>
49	mFOLFOX6 + Trastuzumab (初回)	mFOLFOX6 は2週ごと、Trastuzumab は3週ごとに投与する。	1	<p>13</p> <p>パロリチン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タケダ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「トー」 (規格なし) :200m g/m<sup>2</sup> Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85m g/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」 5 0 m L :1瓶 Day1  フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「トー」:400m g/m<sup>2</sup> Day1  生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1  フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「トー」:2400m g/m<sup>2</sup> Day1  生食注シリンジ「テルモ」 1 0 m L (スリッパチップ) :1筒 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1  トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :8m g/kg Day1</p>

50	mFOLFOX6 (Trastuzumab併用)	mFOLFOX6 は2週ごと、 Trastuzumab は3週ごとに投与する。	1	6	<p>パロセトロン点滴静注「パックス」0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「トール」(規格なし):200mg/m<sup>2</sup> Day1  オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」500mL:1瓶 Day1  フルオロウラシル注1000mg「トール」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食(100mL):1瓶 Day1  フルオロウラシル注1000mg「トール」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッパチップ):1筒 Day1</p>
51	Trastuzumab (2回目以降)	胃癌:ハーセプチン単剤での投与不可(他の抗悪性腫瘍剤と併用)。mFOLFOX6 は2週ごと、Trastuzumabは3週ごと。	1	6	<p>生食(100mL):1瓶 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1  トラスツズマブB点点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1</p>



52	mFOLFOX6 + Trastuzumab (2回目以降)	mFOLFOX6 は2週ごと、 Trastuzumab は3週ごとに投与する。	1	13	<p>パロピト点滴静注「バク」0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1  フルオウラシル注1000mg「ト」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食 (100mL) :1瓶 Day1  フルオウラシル注1000mg「ト」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッ「フ」) :1筒 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.285mL/kg Day1  トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイ」 (規格なし) :6mg/kg Day1</p>
40	Trastuzumab (初回) + S1 + CDDP	ファイは80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口 投与 (2週投与1週休薬)。アピ「タ」 (day1~3) 併用。	3	18	<p>ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.38mL/kg Day1  トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイ」 (規格なし) :8mg/kg Day1  パロピト点滴静注「バク」0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1  生食 (500mL) :1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60mg/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day1  ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1  硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1</p>

41	Trastuzumab (2回目以降) + S1 + CDDP	<p>ティ-1スクンは80mg/m<sup>2</sup>をday1~14経口投与(2週投与1週休業)。アプロピタト(day1~3)併用。</p>	3	<p>18</p> <p>ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1  トラスツズマブB S点滴静注用「ファイター」(規格なし):6mg/kg Day1  パロノセト点滴静注「バック」0.75mg/50mL「タイウ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg(リソ酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1  生食(500mL):1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1</p>
18	Trastuzumab (初回) + S1 + CDDP	<p>ティ-1スクンは80mg/m<sup>2</sup>をday1~21経口投与(3週投与2週休業)。アプロピタト(day8~10)併用。</p>	3	<p>1</p> <p>ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1  ハーセプチン注射用(規格なし):8mg/kg Day1  パロノセト点滴静注「バック」0.75mg/50mL「タイウ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg(リソ酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1  生食(500mL):1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1</p>

19	Trastuzumab (2回目以降) +S1+CDDP	<p>ティ-1スタンは80mg/m<sup>2</sup>をday1~21経口投与(3週投与2週休薬)。アプロピタト(day8~10)併用。</p>	3	1	<p>ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3          硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1          大塚生食注(250mL):1袋 Day1          注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1          トラスツズマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし):6mg/kg Day1          パロメトロン点滴静注バツク0.75mg/50mL「夕休」:1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg(リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1          デキサート注射液1.65mg(リソ酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1          生食(500mL):1瓶 Day1          シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m<sup>2</sup> Day1          20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1</p>
22	S1+CDDP	<p>ティ-1スタンは80mg/m<sup>2</sup>をday1~21経口投与(3週投与2週休薬)。アプロピタト(day8~10)併用。</p>	3	1	<p>ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3          硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1          パロメトロン点滴静注バツク0.75mg/50mL「夕休」:1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg(リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1          デキサート注射液1.65mg(リソ酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1          生食(500mL):1瓶 Day1          シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m<sup>2</sup> Day1          20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1</p>
23	Trastuzumab (初回)	3週毎投与。	1	0	<p>生食(1000mL):1瓶 Day1          大塚生食注(250mL):1袋 Day1          注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1          トラスツズマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし):8mg/kg Day1</p>

24	Trastuzumab (2回目以降)	3週毎投与。	1	0	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :6m g/kg Day1
46	SOX + Trastuzumab (初回)	ファイソワは80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与 (2週投与1週休業)。	1	20	グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :8m g/kg Day1
47	SOX + Trastuzumab (2回目以降)	ファイソワは80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与 (2週投与1週休業)。	1	20	グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :6m g/kg Day1

36	Weekly PTX+Trastuzumab (初回)	ビタミン5錠内服。PTXは3週投与1週休薬, Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1  トラスツズマブ B S点滴静注用「ファイター」(規格なし) :8m g/kg Day1  パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :80m g/m Day1  生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1</p>
37	Weekly PTX	ビタミン5錠内服。3週投与1週休薬。	1	0	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1  生食 ( 1 0 0 m L ) :1瓶 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :80m g/m Day1  生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1</p>
38	Trastuzumab (2回目以降)	3週毎投与。	1	0	<p>生食 ( 1 0 0 m L ) :1瓶 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1  トラスツズマブ B S点滴静注用「ファイター」(規格なし) :6m g/kg Day1</p>

39	Weekly PTX+Trastuzumab (2回目以降)	<p>以タシ5錠内服。PTXは3週投与1週休薬, Trastuzumabは3週毎投与。</p>	1	0	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1  トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイバー」(規格なし) :6m g/kg Day1  パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :80m g/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1</p>
33	XP+Trastuzumab (初回)	<p>カ<sup>2</sup>シタ<sup>2</sup>2000mg/m<sup>2</sup>分2をday1~14投与 (2週投与1週休薬)。ア<sup>2</sup>ルビ<sup>2</sup>タ<sup>2</sup>ント (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。</p>	3	18	<p>ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1  トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイバー」(規格なし) :8m g/kg Day1  パ<sup>2</sup>ロ<sup>2</sup>セ<sup>2</sup>ト<sup>2</sup>点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1  生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「Y D」(300mL袋) :1袋 Day1</p>

34	XP + Trastuzumab (2回目以降)	<p>カドシタ<sup>®</sup> 2000mg/m<sup>2</sup>分2をday1～14投与(2週投与1週休薬)。アプレキタ<sup>®</sup>ント (day1: 125mg, day2～3: 80mg) 併用。</p>	3	<p>18</p> <p>ソルデム3A輸液(500mL袋): 1袋 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管): 10mL Day1  大塚生食注(250mL): 1袋 Day1  注射用水(20mL管): 0.285mL/kg Day1  トラスツズマブB S点滴静注用「ファイザ-」(規格なし): 6mg/kg Day1  パロセト<sup>®</sup>点滴静注パック0.75mg/50mL「タレウ」: 1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当): 1瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管): 2管 Day1  生食(500mL): 1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注(規格なし): 80mg/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋): 1袋 Day1</p>
----	--------------------------	--	---	---