

レジメン一覧					2021/11/11 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
210	FOLFIRI		1	13	パロセチン点滴静注パック0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-リ」（規格なし）:200mg/m ² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注用「ト-リ」（規格なし）:150mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-リ」:400mg/m ² Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-リ」:2400mg/m ² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリッブチップ）:1筒 Day1
220	FOLFIRI + Bevacizumab	アバスタブの投与時間は初回90分，2回目以降60分に短縮可。	1	13	パロセチン点滴静注パック0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-リ」（規格なし）:200mg/m ² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注用「ト-リ」（規格なし）:150mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-リ」:400mg/m ² Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-リ」:2400mg/m ² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリッブチップ）:1筒 Day1 アバスタブ点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1

230	FOLFIRI + Cetuximab (11-7目)		8	6	<p>生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッブチップ) :1筒 Day1 パロリチン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :400mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注用「ト」 (規格なし) :150mg/m² Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト」:400mg/m² Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 フルオロウラシル注1000mg「ト」:2400mg/m² Day1 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :250mg/m² Day8</p>
231	FOLFIRI + Cetuximab (21-7目以降)		8	6	<p>生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッブチップ) :1筒 Day1 パロリチン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :250mg/m² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注用「ト」 (規格なし) :150mg/m² Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト」:400mg/m² Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 フルオロウラシル注1000mg「ト」:2400mg/m² Day1</p>

240	FOLFIRI + Panitumumab		1	13	<p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイク」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし):200mg/m² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」(規格なし):150mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッブチップ):1筒 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1</p>
250	CPT-11 + Cetuximab (1日-8日)		8	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液(100mg/20mL):400mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」(規格なし):150mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day8 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day8 アービタックス注射液(100mg/20mL):250mg/m² Day8</p>
251	CPT-11 + Cetuximab (2日-8日以降)		8	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液(100mg/20mL):250mg/m² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」(規格なし):150mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day8</p>

260	CPT-11 + Panitumumab		1	13	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリー」（規格なし）：150mg/m² Day1</p>
270	IRIS	<p>ファイスタンは80mg/m²をday1～14経口投与（2週投与2週休薬）。</p>	15	13	<p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」：1袋 Day15 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day15 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリー」（規格なし）：125mg/m² Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day15</p>
280	SIR + Bevacizumab	<p>アバスタンの投与時間は初回90分，2回目以降60分に短縮可。ファイスタンは80mg/m²をday1～14経口投与（2投与1休）。</p>	1	20	<p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリー」（規格なし）：150mg/m² Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1 アバスタン点滴静注用（規格なし）：7.5mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1</p>

281	CapeIRI + Bevacizumab	アバスタチンは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。カペシタチンは1600mg/m ² /day をday1～14経口投与（2投与1休）。	1	20	<p>パロセチン点滴静注パック0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリー」（規格なし）:200mg/m² Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用（規格なし）:7.5mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
290	FOLFIRI + Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。	1	13	<p>パロセチン点滴静注パック0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「トリー」（規格なし）:200mg/m² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリー」（規格なし）:150mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トリー」:400mg/m² Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トリー」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリッパチップ）:1筒 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用（規格なし）:8mg/kg Day1</p>

300	FOLFIRI + Aflibercept		1	13	<p>パロセトロン点滴静注パック[®]0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-リ」(規格なし):200mg/m² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-リ」(規格なし):180mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-リ」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-リ」:2400mg/m² Day1 生食シリンジ「テルモ」10mL(スリッブ[®]チップ[®]):1筒 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 ザルトラップ点滴静注(規格なし):4mg/kg Day1</p>
440	FOLFOXIRI		1	13	<p>パロセトロン点滴静注パック[®]0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-リ」(規格なし):200mg/m² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-リ」(規格なし):165mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-リ」:3200mg/m² Day1 生食シリンジ「テルモ」10mL(スリッブ[®]チップ[®]):1筒 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1</p>
441	FOLFOXIRI + Bevacizumab (導入療法)	<p>最大12回。アバスタチンの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。</p>	1	13	<p>大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-リ」(規格なし):200mg/m² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-リ」(規格なし):165mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-リ」:3200mg/m² Day1 生食シリンジ「テルモ」10mL(スリッブ[®]チップ[®]):1筒 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 パロセトロン点滴静注パック[®]0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1</p>

442	FL + Bev (維持療法)	アバスタブの投与時間は初回90分, 2回目以降60分に短縮可。	1	13	<p>生食 (100mL) : 1瓶 Day1 アバスタブ点滴静注用(規格なし): 5mg/kg Day1 大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし) : 200mg/m² Day1 フルオロウラシル注 1000mg「ト-7」: 3200mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッ・チップ) : 1筒 Day1 グラニセトロン点滴静注液「バッグ」1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1</p>
443	mFOLFOXIRI + Bevacizumab (導入療法)	最大12コース。アバスタブの投与時間は初回90分, 2回目以降60分, 3回目以降30分に短縮可。	1	13	<p>大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし) : 200mg/m² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」(規格なし) : 150mg/m² Day1 生食 (100mL) : 1瓶 Day1 フルオロウラシル注 1000mg「ト-7」: 2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッ・チップ) : 1筒 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) : 85mg/m² Day1 パロセトロン点滴静注液「バッグ」0.75mg/50mL「タレウ」: 1袋 Day1 プロイメド点滴静注用150mg: 1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 アバスタブ点滴静注用(規格なし): 5mg/kg Day1</p>
444	modifiedFL + Bev (維持療法)	アバスタブの投与時間は初回90分, 2回目以降60分, 3回目以降30分に短縮可。	1	13	<p>大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし) : 200mg/m² Day1 生食 (100mL) : 1瓶 Day1 フルオロウラシル注 1000mg「ト-7」: 2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッ・チップ) : 1筒 Day1 グラニセトロン点滴静注液「バッグ」1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 アバスタブ点滴静注用(規格なし): 5mg/kg Day1</p>

10	mFOLFOX6		1	13	<p>パロセトロン点滴静注「ハック」0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-ワ」(規格なし):200mg/m² Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-ワ」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-ワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッブ「フッ」):1筒 Day1</p>
20	mFOLFOX6 + Bevacizumab	<p>アバスタブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。</p>	1	13	<p>パロセトロン点滴静注「ハック」0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-ワ」(規格なし):200mg/m² Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-ワ」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-ワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッブ「フッ」):1筒 Day1 アバスタブ点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1</p>

30	mFOLFOX6 + Panitumumab		1	13	<p>パロセト点滴静注パック0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-」(規格なし):200mg/m² Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッチップ):1筒 Day1 ペクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1</p>
40	FOLFOX4		2	12	<p>パロセト点滴静注パック0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 Day2 レボホリナート点滴静注用「ト-」(規格なし):100mg/m² Day1 Day2 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 フルオウラシル注1000mg「ト-」:400mg/m² Day1 Day2 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 フルオウラシル注1000mg「ト-」:600mg/m² Day1 Day2 生食(20mL):1管 Day2</p>

50	FOLFOX4 + Bevacizumab	アバスタチンの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	2	12	<p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 Day2 レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし):100mg/m² Day1 Day2 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:400mg/m² Day1 Day2 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:600mg/m² Day1 Day2 生食(100mL):1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 生食(20mL):1管 Day2</p>
60	CapeOX	カペシタチンは2000mg/m ² をday1の夕からday15の朝まで内服(2週投与1週休薬)。	1	20	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
70	CapeOX + Bevacizumab	カペシタチンは2000mg/m ² をday1の夕からday15の朝まで内服。アバスタチンは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	1	20	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1</p>

80	SOX	テーエスワは80mg/m ² をday1~14経口投与（2週投与1週休薬）。	1	20	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）:130mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
90	SOX + Bevacizumab	テーエスワは80mg/m ² をday1~14経口投与（2週投与1週休薬）。アバスタチンは2回目60分，3回目~30分に短縮可。	1	20	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）:130mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用（規格なし）:7.5mg/kg Day1
410	Cetuximab（初回）		1	6	生食（100mL）:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 ポラミン注5mg（1mL管）:1管 Day1 大塚生食注（250mL）:1袋 Day1 アービタックス注射液（100mg/20mL）:400mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
411	Cetuximab（2回目以降）		1	6	生食（100mL）:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 ポラミン注5mg（1mL管）:1管 Day1 大塚生食注（250mL）:1袋 Day1 アービタックス注射液（100mg/20mL）:250mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1

415	Cetuximab (初回) + Encorafenib±Binimetinib		1	6	生食 (100 mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg g/20mL) :400mg /m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50 mL :1瓶 Day1
416	Cetuximab (2回目以降) + Encorafenib±Binime		1	6	生食 (100 mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg g/20mL) :250mg /m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50 mL :1瓶 Day1
420	Panitumumab		1	13	生食 (100 mL) :1瓶 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg:6mg /kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50 mL :1瓶 Day1
421	Panitumumab(デキサートあり)		1	13	生食 (100 mL) :1瓶 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg:6mg /kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50 mL :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1

430	5FU+LV (sLV5FU2法)		1	13	<p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-」(規格なし):200mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッ°フッ°):1筒 Day1</p>
431	5FU+LV (RPMI法)	11-スは、週1回、6週連続投与2週休薬。	1	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-」(規格なし):250mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-」:600mg/m² Day1</p>
450	FL+Bevacizumab (bolusあり)	アバスタブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	1	13	<p>大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-」(規格なし):200mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッ°フッ°):1筒 Day1 アバスタブ点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1</p>

460	Bevacizumab+経口フッ化ピリミジン系抗がん薬	アバスタチンは2回目60分, 3回目以降30分に短縮可。	1	20	生食 (100 mL) :1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1
470	Bevacizumab+トリフルリジン/チピラシル	ロンサーフは35mg/m ² をday1~5,8~12まで内服。アバスタチンは2回目60分, 3回目以降30分に短縮可。	15	13	生食 (100 mL) :1瓶 Day1 Day15 アバスタチン点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 Day15
10	5FU + MMC + RT		32	3	生食 (100 mL) :1瓶 Day1 Day29 ラクテック注 (500 mL) :1袋 Day1 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day4 ソルデム1輸液 (500 mL):1袋 Day1 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day4 フルオウラシル注 1000mg「ト」:1000mg/m ² Day1 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day4 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day1 Day4 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day2 Day30 Day31 Day32 Day4 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day29 Day1 生理食塩液「ヒカリ」500 mL :1瓶 Day29 Day1 マイトマイシン注用 100mg :10mg/m ² Day29 Day1

11	5FU+MMC+RT (q4w)		4	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラケック注 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオウラシル注 1000mg「ト-7」:1000mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 Day1 Day3 Day4 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 マイトマイシン注用 10mg :10mg/m² Day1</p>
----	------------------	--	---	--