

レジメナー覧					2021/11/11 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休業 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
25	TIP	ルト確保時，ビタミン5錠内服。アプロピタン ト（day1：125mg，day2～3： 80mg）併用。day4～フィルグラステム併 用。	3	18	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 4 0 0 m g :400m g /m Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 Day2 Day3 イホマイド 1 g〔注射用〕：1.2 g /m Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 4 0 0 m g :200m g /m Day1 Day2 Day3 ソルデム1輸液（500mL袋）：1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10m L Day1 Day2 Day3 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」（10mL）：10m L Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注（規格なし）：25m g /m Day1 Day2 Day3 20%マンニトール注射液「Y D」（300mL袋）：200m L Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液（500mL袋）：1袋 Day1 Day2 Day3 メイロン静注7%（20mL管）：2管 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」（50mL瓶）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg）（2mL管）：1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 生食（500mL瓶）：1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」（規格なし）：175m g /m Day1
21	Temsirolimus		1	6	生食（1 0 0 m L）：1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1 ポラミン注 5 mg:1管 Day1 生食（2 5 0 m L）：1瓶 Day1 トーリセル点滴静注液25mg:25m g Day1

23	Nivolumab+Ipilimumab	導入療法（3週毎の4コース）と、維持療法（2週毎 または 4週毎）の2段階で行う。	1	20	生食（100mL）:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg（24mL瓶）:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:20mL Day1 ヤーボイ点滴静注液50mg:1mg/kg Day1
28	Avelumab+Axitinib	インライタ併用。ルート確保時、レスタミン50mg、カロナール500mg（又は同等の薬剤）を内服。	1	13	生食（200mL瓶）:1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 バベンチオ点滴静注200mg(10mL/瓶):10mg/kg Day1
22-1	Nivolumab（q2w）		1	13	生食（100mL）:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg（24mL瓶）:1瓶 Day1
26-1	Pembrolizumab（q3w）+Axitinib	アキシチニブは1日2回連日経口投与。	1	20	生食（100mL）:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg（100mg/4mL）:200mg Day1
22-2	Nivolumab（q4w）		1	27	生食（100mL）:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg（24mL瓶）:2瓶 Day1
26-2	Pembrolizumab（q6w）+Axitinib	アキシチニブは1日2回連日経口投与。	1	41	生食（100mL）:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg（100mg/4mL）:400mg Day1

14	BEP		15	6	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          生食 (500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          シスプラチン点滴静注 (規格なし):20mg/g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          ソリュージェンF注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          生食 (100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15          プレオ注射用 (規格なし):30mg/g Day1 Day8 Day15          フロセミド注20mg「トロー」(ラシックス):0.5管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          ラクテック注 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
19	CBDCA単剤 (セミノールI期)		1	20	<p>生食 (100mL):1瓶 Day1          パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1          大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1          カルボプラチン点滴静注液 (規格なし):0mg/A Day1</p>
10	DOC		1	20	<p>生食 (100mL):1瓶 Day1          大塚生食注(250mL):1袋 Day1          ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):70mg/g Day1</p>

15	Cabazitaxel	投与開始日よりプレドニン10mg（1回5mg，1日2回朝と昼）連日服用。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 ジェブタナ点滴静注60mg:25mg/m <sup>2</sup> Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 ポララミン注5mg：1管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1
11	GC	アピカタ（day2：125mg，day3～4：80mg）併用。	8	13	ソルデム3A輸液（500mL袋）：1袋 Day3 Day4 Day2 生食（100mL）：1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液（5%100mL）：1瓶 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注液（規格なし）：1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day2 パロセトンの点滴静注パック0.75mg/50mL「タレウ」：1袋 Day2 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day2 デキサート注射液1.65mg（リソ酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day2 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10mL Day2 生食（500mL）：1瓶 Day2 シスプラチン点滴静注（規格なし）：70mg/m <sup>2</sup> Day2 20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：1袋 Day2

12	GEM		8	<p>13 生食（100mL）：1瓶 Day1 Day8          ブドウ糖注射液（5%100mL）：1瓶 Day1 Day8          ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）：1000mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8</p>
13	M-VAC	<p>アプロタクト（day2：125mg,          day3,4：80mg）併用。day1, 15,          22の13時, 16時, 19時, 22時に0.1g          ホリソ5mg錠内服</p>	22	<p>6 ソリューゲンG注500mLソフトバッグ：1袋 Day1          メイロン（7%20mL）：1管 Day1 Day15 Day22          生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 Day15 Day22          注射用メソレキセート（規格なし）：30mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15 Day22          ラクテックG輸液（500mL）：1袋 Day15 Day22          エクザール注射用10mg：3mg/m<sup>2</sup> Day15 Day22          ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day2 Day3 Day4          ドキソルピシン塩酸塩注射用（規格なし）：30mg/m<sup>2</sup> Day2          パロチド点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイチ」：1袋 Day2          デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day2          デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day2          生食（500mL）：1瓶 Day2          シスプラチン点滴静注（規格なし）：70mg/m<sup>2</sup> Day2          20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：200mL Day2          硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10mL Day2</p>

17	GEM+PTX	day1（パクリタセルの投与30分前までに）レスタミン5錠内服。	8	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液（5%100mL）：1瓶 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注液（規格なし）：1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）：2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 パクリタセル注「ホスピール」（規格なし）：175mg/m <sup>2</sup> Day1
18	DOC		1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」（規格なし）：70mg/m <sup>2</sup> Day1
27	Avelumab	プラチナ併用一次化学療法後の維持療法。ルート確保時レスタミン50mg、カロナール500mg（又は同等の薬剤）内服。	1	13	生食（200mL瓶）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 バベンチオ点滴静注200mg(10mL/瓶)：10mg/kg Day1

16-1	GEM+ CBDCA (day1)	CBDCAの目標AUCは3~5で投与（レゾメンはAUC5で設定）腎機能障害のある患者のみ投与可。アプロピタは主治医判断	8	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液（5%100mL）：1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）：1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）：0mg/A Day1
24-1	Pembrolizumab (q3w)		1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg（100mg/4mL）：200mg Day1
16-2	GEM+ CBDCA (day2)	CBDCAの目標AUCは3~5で投与（レゾメンはAUC5で設定）腎機能障害のある患者のみ投与可。アプロピタは主治医判断	8	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 Day8 Day2 ブドウ糖注射液（5%100mL）：1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）：1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day2 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day2 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day2 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）：0mg/A Day2
24-2	Pembrolizumab (q6w)		1	41	生食（100mL）：1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg（100mg/4mL）：400mg Day1