

レジメー一覧				2023/02/08 時点
25	TIP	ルート確保時、レスタミン5錠内服。アプレピタント (day1:125mg, day2~3:80mg)併用。 day4~フィルグラステム併用。	3	18 グラニセトロン点滴静注液「バッグ1mg/50mL HKJ」:1袋 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注400mg:400mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 イホマイド1g〔注射用〕:1.2g/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注400mg:200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 Day2 Day3 アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):10mL Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注(規格なし):25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 メイロン静注7%(20mL管):2管 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 バクリタキセル注「ホスドロー」(規格なし):175mg/m <sup>2</sup> Day1
21	Temsirolimus		1	6 生食(100mL):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 ボラミン注5mg:1管 Day1 生食(250mL):1瓶 Day1 トーリセル点滴静注25mg:25mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
23	Nivolumab + Ipilimumab	導入療法(3週毎の4コース)と、維持療法(2週毎 または 4週毎)の2段階で行う。	1	20 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:20mL Day1 ヤーボイ点滴静注50mg:1mg/kg Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1
28	Avelumab+Axitinib	インライタ併用。ルート確保時、レスタミン50mg、カロナール500mg(又は同等の薬剤)を内服。	1	13 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 バベンチオ点滴静注200mg(10mL/瓶):10mg/kg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
22-1	Nivolumab (q2w)		1	13 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
22-2	Nivolumab (q4w)		1	27 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):2瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
26-1	Pembrolizumab (q3w) + Axitinib	アキシチニブは1日2回連日経口投与。	1	20 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
26-2	Pembrolizumab (q6w) + Axitinib	アキシチニブは1日2回連日経口投与。	1	41 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):400mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
29-1	Pembrolizumab (q3w) + Lenvatinib	レンバチニブは1日1回連日経口投与。	1	20 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
29-2	Pembrolizumab (q6w) + Lenvatinib	レンバチニブは1日1回連日経口投与。	1	41 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):400mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1

14	BEP		15	6	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          シスプラチン点滴静注(規格なし):20mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          ソリュージェンF注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15          プレオ注射用(規格なし):30mg Day1 Day8 Day15          フロセミド注20mg「トローワ」(ランックス):0.5管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          ラクテック注 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          生食(100mL):1瓶 Day1</p>
19	CBDCA単剤(セミノマ I 期)		1	20	<p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1          大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1          カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1          生食(100mL):1瓶 Day1</p>
10	DOC		1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1          ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):70mg/m<sup>2</sup> Day1          生食(100mL):1瓶 Day1</p>
15	Cabazitaxel	投与開始日よりブレドニン10mg(1回5mg, 1日2回朝と昼)連日服用。	1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1          ジェブタナ点滴静注60mg:25mg/m<sup>2</sup> Day1          デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1          ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1          ポラミン注5mg:1管 Day1          生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1          生食注「リンジ」テルモ「10mL(スリフチップ)」:1筒 Day2 Day3</p>
11	GC	アブレピタント(day2:125mg, day3~4:80mg)併用。	8	13	<p>ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day3 Day4 Day2          生食(100mL):1瓶 Day1 Day8          ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8          ギムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8          ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day2          パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day2          デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day2          デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day2          硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day2          生食(500mL):1瓶 Day2          シスプラチン点滴静注(規格なし):70mg/m<sup>2</sup> Day2          20%マンニトール注射液「YDI」(300mL袋):1袋 Day2          生食(100mL):1瓶 Day1 Day8</p>
12	GEM		8	13	<p>ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8          ギムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8</p>

13	M-VAC	アプレビタント(day2:125mg, day3,4:80mg)併用。day1, 15, 22の13時, 16時, 19時, 22時にロイコホリン5mg2錠内服	22	6	ソリューゲンG注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 メイロン (7%20mL):1管 Day1 Day15 Day22 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day15 Day22 注射用メソトレキセート(規格なし):30mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day22 ラクテックG輸液 (500mL):1袋 Day15 Day22 イクザール注射用10mg:3mg/m <sup>2</sup> Day15 Day22 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day2 Day3 Day4 ドキシソルピニン塩酸塩注射用(規格なし):30mg/m <sup>2</sup> Day2 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day2 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day2 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day2 生食(500mL):1瓶 Day2 シスプラチン点滴静注(規格なし):70mg/m <sup>2</sup> Day2 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day2 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day2 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):175mg/m <sup>2</sup> Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
17	GEM+PTX	day1(パクリタキセルの投与30分前までに)レスタミン5錠内服。	8	13	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):70mg/m <sup>2</sup> Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 バベンチオ点滴静注200mg(10mL/瓶):10mg/kg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 注射用水(20mL管):0.125mL/kg Day1 Day8 Day15 パドセブ点滴静注用30mg/瓶:1.25mg/kg Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day2 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day2 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day2 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day2 生食(100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):400mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1
18	DOC		1	20	
27	Avelumab	プラチナ併用一次化学療法後の維持療法。ルート確保時レスタミン50mg、カロナール500mg(又は同等の薬剤)内服。	1	13	
31	Enfortumab Vedotin		15	13	
16-1	GEM+CBDCA (day1)	CBDCAの目標AUCは3~5で投与(レジメンはAUC5で設定)腎機能障害のある患者のみ投与可。アプレビタントは主治医判断	8	13	
16-2	GEM+CBDCA (day2)	CBDCAの目標AUCは3~5で投与(レジメンはAUC5で設定)腎機能障害のある患者のみ投与可。アプレビタントは主治医判断	8	13	
24-1	Pembrolizumab (q3w)		1	20	
24-2	Pembrolizumab (q6w)		1	41	
30-1	Nivolumab (q2w)	術後補助療法、投与期間は12ヵ月までとする。	1	13	

30-2	Nivolumab (q4w)	術後補助療法、投与期間は12ヵ月までとする。	1	27 生食(100mL):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):2瓶 Day1
------	-----------------	------------------------	---	--