

# レジメン一覧

2026/02/24 時点

| コード | レジメン名                     | コメント  | 投与<br>日数 | 休業<br>期間 | 薬剤情報   |
|-----|---------------------------|---|----------|----------|--|
|     |                           |   |          |          | 薬品名：数量 投与日   |
| 10  | CBDCA + PTX               | ビタミン5錠内服。   | 1        | 20       | 生食（100mL）：1瓶 Day1<br>デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：2瓶 Day1<br>デキサート注射液1.65mg（リソ酸エステル2mg相当）：2管 Day1<br>ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1<br>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1<br>生食（500mL）：1瓶 Day1<br>パクリタキセル注「ネビテラ」（規格なし）：180mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液（規格なし）：0mg/g/A Day1<br>大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day1  |
| 11  | CBDCA + PTX + Bevacizumab | ビタミン5錠内服。ベバシズマブの投与時間は2回目60分，3回目以降30分に短縮可。                                   | 1        | 20       | 生食（100mL）：1瓶 Day1<br>ベバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし)：15mg/kg Day1<br>デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：2瓶 Day1<br>デキサート注射液1.65mg（リソ酸エステル2mg相当）：2管 Day1<br>ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1<br>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1<br>生食（500mL）：1瓶 Day1<br>パクリタキセル注「ネビテラ」（規格なし）：180mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液（規格なし）：0mg/g/A Day1<br>大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day1  |
| 12  | Weekly PTX + CBDCA + RT   | ビタミン5錠内服。治療終了後、引き続きPTX(200mg/m <sup>2</sup> ) + CBDCA（AUC5）day1のみ投与を2コース施行。 | 36       | 6        | 生食（100mL瓶）：1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>デキサート注射液1.65mg（リソ酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>パクリタキセル注「ネビテラ」（規格なし）：40mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>カルボプラチン点滴静注液（規格なし）：0mg/g/A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 |

|    |                           |   |    |    |   |
|----|---------------------------|---|----|----|---|
| 20 | CBDCA + PEM               | 投与7日前にメトホルミル注1mg筋注（3回毎に1回程度）、投与7日前よりピロピロ1g内服（連日服用）。 | 1  | 20 | ソルデム3A輸液（500mL）:1袋 Day1<br>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg（リシ酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1<br>生食（100mL）:1瓶 Day1<br>ペメトレキセド点滴静注液「トリ」(規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1   |
| 21 | CBDCA + PEM + Bevacizumab | 投与7日前にメトホルミル注1mg筋注（3回毎に1回程度）、投与7日前よりピロピロ1g内服（連日服用）。 | 1  | 20 | ソルデム3A輸液（500mL）:1袋 Day1<br>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg（リシ酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1<br>生食（100mL）:1瓶 Day1<br>ペメトレキセド点滴静注液「トリ」(規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1<br>ペバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):15mg/kg Day1 |
| 40 | CBDCA + GEM               |   | 8  | 13 | グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8<br>デキサート注射液6.6mg（リシ酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8<br>生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8                        |
| 50 | CBDCA + CPT-11            |   | 15 | 13 | グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15<br>デキサート注射液6.6mg（リシ酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 Day15<br>大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 Day8 Day15<br>イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」(規格なし):50mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15          |
| 60 | CBDCA + VNR               |   | 8  | 20 | グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg（リシ酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8<br>大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8<br>ロゼウス静注液（規格なし）:20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>生食（100mL）:1瓶 Day8           |
| 70 | CBDCA + S1                | ペイ-エソはday1～14経口投与（2週投与1週休業）。                        | 1  | 20 | グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg（リシ酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1<br>大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  |

|     |                                 |   |    |    |   |
|-----|---------------------------------|---|----|----|---|
| 80  | CBDCA+VP16                      |   | 3  | 25 | <p>グラセトロン点滴静注液「バグ」1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3<br/> デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3<br/> 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1<br/> カルボプラチン点滴静注液 (規格なし):0mg/A Day1<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3<br/> 生食 (500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3<br/> イトボシド点滴静注液100mg「サンド」(ラスト):100mg/g/m Day1 Day2 Day3</p>  |
| 100 | CBDCA+nab-PTX                   |   | 15 | 13 | <p>パロセトロン点滴静注液「バグ」0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15<br/> 生食 (100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15<br/> アプタキサン点滴静注用100mg:100mg/g/m Day1 Day8 Day15<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15<br/> 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1<br/> カルボプラチン点滴静注液 (規格なし):0mg/A Day1</p>   |
| 220 | CDDP+PEM                        | アプレタクト (day1:125mg, day2,3:80mg) 併用。投与7日前にメコパール注1mg筋注, 投与7日前よりパレタクト1g内服 | 3  | 18 | <p>パロセトロン点滴静注液「バグ」0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1<br/> デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管):2管 Day1<br/> 生食 (500mL):1瓶 Day1<br/> シスプラチン点滴静注 (規格なし):75mg/m Day1<br/> 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1<br/> 生食 (100mL):1瓶 Day1<br/> ペメトレキセド点滴静注液「トク」(規格なし):500mg/m Day1<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1<br/> ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3<br/> 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管):10mL Day1</p>  |
| 221 | CDDP+PEM (NSCLC) (ショートハイドレーション) | アプレタクト(day1:125mg, day2,3:80mg) 併用。投与7日前にメコパール注1mg筋注, 投与7日前よりパレタクト1g内服。 | 1  | 20 | <p>生食 (100mL瓶):1瓶 Day1<br/> パロセトロン点滴静注液「バグ」0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1<br/> デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管):2管 Day1<br/> 生食 (500mL瓶):1瓶 Day1<br/> シスプラチン点滴静注 (規格なし):75mg/m Day1<br/> ペメトレキセド点滴静注液「トク」(規格なし):500mg/m Day1<br/> 大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br/> ソルデム1輸液 (500mL袋):1袋 Day1<br/> 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管):10mL Day1<br/> アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」(10mL):1キット Day1<br/> 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1</p> |

|     |                          |  |    |    |   |
|-----|--------------------------|--|----|----|---|
| 230 | CDDP+GEM                 | ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。 | 8  | 13 | <p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8<br/> デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day1<br/> 生食 ( 1 0 0 m L ) :1瓶 Day8 Day1<br/> ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000m g/m Day8 Day1<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8<br/> パ°ロ°レト°点滴静注パ°ック° 0.75mg/50mL「タ体切」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1<br/> 生食 ( 5 0 0 m L ) :1瓶 Day1<br/> シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g/m Day1<br/> 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1<br/> ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3<br/> 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p>                   |
| 240 | CDDP+CPT-11 (NSCLC)      | ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。 | 15 | 13 | <p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15<br/> デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15<br/> 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15<br/> イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト°」 (規格なし) :60m g/m Day8 Day15<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day15<br/> パ°ロ°レト°点滴静注パ°ック° 0.75mg/50mL「タ体切」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1<br/> 生食 ( 5 0 0 m L ) :1瓶 Day1<br/> シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g/m Day1<br/> 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1<br/> ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3<br/> 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p> |
| 241 | CDDP+CPT-11 (NSCLC放射線併用) | ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。 | 15 | 13 | <p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15<br/> デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15<br/> 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15<br/> イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト°」 (規格なし) :50m g/m Day8 Day15<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day15<br/> パ°ロ°レト°点滴静注パ°ック° 0.75mg/50mL「タ体切」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1<br/> 生食 ( 5 0 0 m L ) :1瓶 Day1<br/> シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g/m Day1<br/> 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1<br/> ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3<br/> 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p> |

|     |                                    |  |    |    |  |
|-----|------------------------------------|--|----|----|--|
| 242 | CDDP+CPT-11 (SCLC)                 | ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。                                     | 15 | 13 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15<br/> デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15<br/> 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15<br/> イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト」 (規格なし) :60m g/m Day8 Day15<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day15<br/> パ°ロ°セト°点滴静注パ°ツグ°0.75mg/50mL「タ休」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1<br/> 生食 (500mL) :1瓶 Day1<br/> シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g/m Day1<br/> 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1<br/> ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3<br/> 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p>  |
| 243 | CDDP+CPT-11 (SCLC放射線併用)            | ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。                                     | 15 | 13 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15<br/> デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15<br/> 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15<br/> イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト」 (規格なし) :40m g/m Day8 Day15<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day15<br/> パ°ロ°セト°点滴静注パ°ツグ°0.75mg/50mL「タ休」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1<br/> 生食 (500mL) :1瓶 Day1<br/> シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g/m Day1<br/> 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1<br/> ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3<br/> 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p>  |
| 244 | CDDP+CPT-11 (NSCLC) (ショートハイドレーション) | ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給推奨 (day1~3) | 15 | 13 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15<br/> デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15<br/> 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day1 Day15<br/> イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト」 (規格なし) :60m g/m Day8 Day1 Day15<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day1 Day15<br/> 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1<br/> パ°ロ°セト°点滴静注パ°ツグ°0.75mg/50mL「タ休」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1<br/> 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1<br/> シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g/m Day1<br/> 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day1<br/> 大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br/> ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day1<br/> アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「ル」 (10mL) :1キット Day1<br/> 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1<br/> デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day15</p> |

|     |                                   |  |    |    |  |
|-----|-----------------------------------|--|----|----|--|
| 245 | CDDP+CPT-11 (SCLC) (ショートハイドレーション) | ア°比°タト (day1: 125mg, day2~3: 80mg) 併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給推奨 (day1~3) | 15 | 13 | <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15<br/> デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day1<br/> 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day1 Day15<br/> イリリテカン塩酸塩点滴静注液「ト」 (規格なし) :60m g/m Day8 Day1 Day15<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day1 Day15<br/> 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1<br/> パ°ロ/セトの点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1<br/> 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1<br/> シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g/m Day1<br/> 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day1<br/> 大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br/> ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day1<br/> アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「レ」 (10mL) :1キット Day1<br/> 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1<br/> デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day15</p> |
| 250 | CDDP+VNR                          | ア°比°タト (day1: 125mg, day2~3: 80mg) 併用。                                     | 8  | 20 | <p>生食 (100mL) :1瓶 Day8<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day1<br/> ロゼウス静注液 (規格なし) :25m g/m Day8 Day1<br/> パ°ロ/セトの点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8<br/> デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1<br/> 生食 (500mL) :1瓶 Day1<br/> シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g/m Day1<br/> 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1<br/> ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3<br/> 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p>  |
| 260 | CDDP+S1 (放射線同時併用)                 | ア°比°タト (day1: 125mg, day2~3: 80mg) 併用。テーミンはday1~14経口投与 (2週投与2週休薬)。         | 3  | 25 | <p>パ°ロ/セトの点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1<br/> デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1<br/> 生食 (500mL) :1瓶 Day1<br/> シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g/m Day1<br/> 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1<br/> ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3<br/> 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p>   |

|     |                                |  |   |    |  |
|-----|--------------------------------|--|---|----|--|
| 261 | CDDP+S1 (NSCLC) (ショートハイドレーション) | ア°ビ°タト(day8:125mg, day9,10:80mg)併用。I<br>スンはday1~21経口投与。追加経口摂取<br>1000mL/day(day8~10) | 1 | 34 | 生食(100mL瓶):1瓶 Day1<br>パ°ロ°レト°点滴静注パ°ツク°0.75mg/50mL「タイチ」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg(リウ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1<br>デキサート注射液1.65mg(リウ酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1<br>生食(500mL瓶):1瓶 Day1<br>シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m <sup>2</sup> Day1<br>20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1<br>アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」(10mL):1キット Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1   |
| 270 | CDDP+VP16 (ショートハイドレーション)       | ア°ビ°タト(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。食<br>事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給の推奨<br>(day1~3)       | 3 | 25 | 生食(100mL瓶):1瓶 Day1<br>パ°ロ°レト°点滴静注パ°ツク°0.75mg/50mL「タイチ」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg(リウ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1<br>デキサート注射液1.65mg(リウ酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1<br>生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3<br>イトボシド点滴静注液100mg「サント」(5mL瓶):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1<br>20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3<br>ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1<br>アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」(10mL):1キット Day1<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1<br>デキサート注射液6.6mg(リウ酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day2 Day3 |
| 271 | CDDP+VP-16                     | ア°ビ°タト(day1:125mg, day2~3:80mg)併<br>用。   | 3 | 18 | パ°ロ°レト°点滴静注パ°ツク°0.75mg/50mL「タイチ」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg(リウ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1<br>デキサート注射液1.65mg(リウ酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1<br>生食(500mL):1瓶 Day1<br>シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1<br>20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1<br>生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3<br>イトボシド点滴静注液100mg「サント」(5mL瓶):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day2 Day3<br>デキサート注射液6.6mg(リウ酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day2 Day3   |
| 610 | Nivolumab (q2w)                |  | 1 | 13 | 生食(100mL):1瓶 Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1<br>オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1  |
| 620 | Nivolumab (q4w)                |  | 1 | 27 | 生食(100mL):1瓶 Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1<br>オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):2瓶 Day1  |

|     |   |   |    |    |   |
|-----|---|---|----|----|---|
| 621 | Nivolumab + Ipilimumab (Nivo q2w)         |   | 29 | 13 | 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day15 Day29<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day15 Day29<br>オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1 Day15 Day29<br>ヤーボイ点滴静注液50mg:1m g/kg Day1   |
| 622 | Nivolumab + Ipilimumab (Nivo q3w)         |   | 22 | 20 | 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day22<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day22<br>オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1 Day22<br>オブジーボ点滴静注120mg (12mL瓶) :1瓶 Day1 Day22<br>ヤーボイ点滴静注液50mg:1m g/kg Day1  |
| 623 | Nivolumab + Ipilimumab + CBDCA + PTX (導入) | メタスタシス5錠内服。アプレタ併用。1コース終了後、Nivolumab+Ipilimumab維持療法へ移行する。          | 22 | 20 | 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day22<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day22<br>オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1 Day22<br>オブジーボ点滴静注120mg (12mL瓶) :1瓶 Day1 Day22<br>ヤーボイ点滴静注液50mg:1m g/kg Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1 Day22<br>デキサート注射液1.65mg (リ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 Day22<br>ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day22<br>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day22<br>生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 Day22<br>パクリタキセル注「ホビラ」(規格なし) :200m g/m <sup>2</sup> Day1 Day22<br>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day22<br>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0m g/A Day1 Day22 |
| 624 | Nivolumab + Ipilimumab + CBDCA + PEM (導入) | メタスタシス注1mg筋注 (3コース毎に1回程度) ,ホビラ1g内服 (連日服用) ,アプレタ併用,1コース終了後維持 (化ホビ) | 22 | 20 | 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day22<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day22<br>オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1 Day22<br>オブジーボ点滴静注120mg (12mL瓶) :1瓶 Day1 Day22<br>ヤーボイ点滴静注液50mg:1m g/kg Day1<br>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day22<br>デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 Day22<br>ペメトレキセド点滴静注液「トク」(規格なし) :500m g/m <sup>2</sup> Day1 Day22<br>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day22<br>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0m g/A Day1 Day22   |
| 630 | Pembrolizumab (q3w)                       |   | 1  | 20 | 生食 (100mL) :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg (100mg/4mL) :200m g Day1  |

|     |                                    |  |    |    |   |
|-----|------------------------------------|--|----|----|---|
| 631 | Pembrolizumab+ CBDCA+ PTX (導入)     | ルット確保時、レスタミン5錠内服。アプロビタクト (day1:125mg,day2,3:80mg) 併用。4コース後、維持 (Pembrolizumab) へ。 | 1  | 20 | グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1<br>デキサート注射液1.65mg (リ酸エステル2mg相当) :2管 Day1<br>ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1<br>生食 (500mL) :1瓶 Day1<br>パクリタキセル注「ネビラ」(規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1<br>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg (100mg/4mL) :200mg Day1  |
| 632 | Pembrolizumab+ CBDCA+ PEM (導入)     | メチコニール注1mg筋注 (3コース毎に1回程度) , パンペタン1g (連日服用) 。アプロビタクト併用。4コース後、維持 (Pembro+PEM)      | 1  | 20 | 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg (100mg/4mL) :200mg Day1<br>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1<br>生食 (100mL) :1瓶 Day1<br>ペムトレキセド点滴静注液「トワ」(規格なし) :500mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1   |
| 633 | Pembrolizumab+ PEM (維持)            | 投与7日前にメチコニール注1mg筋注 (3コース毎に1回程度) , 投与7日前よりパンペタン1g内服 (連日服用) 。                      | 1  | 20 | 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg (100mg/4mL) :200mg Day1<br>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1<br>生食 (100mL) :1瓶 Day1<br>ペムトレキセド点滴静注液「トワ」(規格なし) :500mg/m <sup>2</sup> Day1   |
| 634 | Pembrolizumab+ CBDCA+ nab-PTX (導入) | アプロビタクト (day1:125mg,day2,3:80mg) 併用。4コース後、維持 (Pembrolizumab) へ。                  | 15 | 6  | グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1<br>生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アラキサン点滴静注用100mg/瓶:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15<br>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1<br>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg (100mg/4mL) :200mg Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15<br>デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day8 Day15 |
| 640 | Pembrolizumab (q6w)                |  | 1  | 41 | 生食 (100mL) :1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注 100mg (100mg/4mL) :400mg Day1   |
| 650 | Atezolizumab                       | 初回60分かけて投与し、忍容性がよければ2回目以降は30分間で短縮可。  | 1  | 20 | 生食 (100mL) :1瓶 Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>テセントリク点滴静注1200mg(20mL):1200mg Day1   |

|     |   |   |    |    |  |
|-----|---|---|----|----|--|
| 651 | Atezolizumab + Bevacizumab + CBDCA + PTX (導入) | ハ®ル®ス®終了後、ビタミン5錠内服。ア®ビ®タ®ト (day1:125mg,day2,3:80mg)併用。4-6J-®終了後、維持(Atezo+Beva)。 | 1  | 20 | 生食 (100mL) :1瓶 Day1<br>ペバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):15mg/kg Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1<br>デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1<br>ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1<br>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>生食 (500mL) :1瓶 Day1<br>バクシキセル注「ル®-®」 (規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1<br>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 |
| 652 | Atezolizumab + Bevacizumab (維持)               |   | 1  | 20 | 生食 (100mL) :1瓶 Day1<br>ペバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):15mg/kg Day1<br>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1   |
| 653 | Atezolizumab + CBDCA + VP-16 (導入)             | ア®ビ®タ®ト (day1:125mg,day2-3:80mg) 併用。4J-®終了後、維持 (Atezolizumab) 。                 | 3  | 18 | グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3<br>デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1<br>生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3<br>エトポシド点滴静注液100mg「サ®ト®」 (5mL瓶) :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1<br>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day2 Day3<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day2 Day3  |
| 654 | Atezolizumab + CBDCA + nab-PTX (導入)           | ア®ビ®タ®ト (day1:125mg,day2-3:80mg) 併用。4又は6J-®終了後、維持 (Atezolizumab) 。              | 15 | 6  | グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15<br>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>アプタキサン点滴静注用100mg/瓶:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day8 Day15<br>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1  |

|     |  |   |   |    |  |
|-----|--|---|---|----|--|
| 655 | Atezolizumab+ CBDCA+ PEM (導入)              | メトホルミル1mg筋注(9週毎に1回), パンセタ1g(連日服用)。アスピリタ併用。4又は6コース後、維持(Atezo+PEM)。       | 1 | 20 | グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg(リシ酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1<br>生食(100mL):1瓶 Day1<br>ペムトレキセド点滴静注液「トワ」(規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1<br>大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1   |
| 656 | Atezolizumab+ PEM (維持)                     | 投与7日前までにメトホルミル注1mg筋注(9週毎に1回), 投与7日以上前よりパンセタ1g内服(連日服用)。                  | 1 | 20 | グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg(リシ酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1<br>生食(100mL):1瓶 Day1<br>ペムトレキセド点滴静注液「トワ」(規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1  |
| 670 | Durvalumab                                 | 体重30kg以下の場合20mg/kg。   | 1 | 27 | 生食(100mL):1瓶 Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>イミフィンジ点滴静注液(規格なし):1500mg Day1   |
| 671 | Durvalumab+ CBDCA+ VP-16 (導入)              | 4コース後、維持療法(イミフィンジ単剤1,500mg 4週ごと)へ移行する。アスピリタ併用。                          | 3 | 18 | 生食(100mL):1瓶 Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>イミフィンジ点滴静注液500mg:3瓶 Day1<br>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3<br>デキサート注射液6.6mg(リシ酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 Day2 Day3<br>生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3<br>イトボンド点滴静注液100mg「サト」(5mL瓶):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day2 Day3  |
| 672 | Durvalumab+ CDDP+ VP-16 (導入) (ジョーナルドレーション) | 4コース後、維持療法(イミフィンジ単剤1,500mg 4週ごと)へ移行する。アスピリタ(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。 | 3 | 18 | 生食(100mL):1瓶 Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>イミフィンジ点滴静注液500mg:3瓶 Day1<br>パロセチン点滴静注液バッグ0.75mg/50mL「タイ初」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg(リシ酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 Day2 Day3<br>デキサート注射液1.65mg(リシ酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1<br>生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3<br>イトボンド点滴静注液100mg「サト」(5mL瓶):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1<br>アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」(10mL):1キット Day1<br>20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1<br>シスプラチン点滴静注液(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3 |

|     |  |  |    |    |  |
|-----|--|--|----|----|--|
| 673 | Durvalumab (SCLC, 維持療法)                          | イミフィング® + Iト®シ® + フ®ラ® 導入療法後に使用。体重30kg以下の場合20mg/kg。                    | 1  | 27 | 生食 (100mL) :1瓶 Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>イミフィング点滴静注液 (規格なし) :1500mg Day1   |
| 680 | Tremelimumab + Durvalumab + CBDCA + nab-PTX (導入) | ア®レ®タ®併用。イミフィング®は体重30kg以下の場合20mg/kg。4コース終了後、Dur→Tre + Dur→Dur→Dur→・・・。 | 15 | 6  | グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リ®酸®イ®テ®ル®8mg相当) :1瓶 Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15<br>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15<br>ア®ラ®キ®サ®ン®点滴静注用100mg/瓶:100mg /ml Day1 Day8 Day15<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>イミフィング点滴静注液 (規格なし) :1500mg Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リ®酸®イ®テ®ル®8mg) (2mL管) :1瓶 Day8 Day15<br>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg /A Day1<br>生理食塩液PL「フ®」(100mL/瓶):1瓶 Day1<br>イ®ジ®ユ®ド®点滴静注25mg:75mg Day1 |
| 681 | Tremelimumab + Durvalumab (維持 5・6コース目)           | イミフィング®は体重30kg以下の場合20mg/kg。4コース終了後、Dur→Tre + Dur→Dur→Dur→・・・。          | 29 | 27 | 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day29<br>生理食塩液PL「フ®」(100mL/瓶):1瓶 Day29<br>イ®ジ®ユ®ド®点滴静注25mg:75mg Day29<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day29<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day29 Day1<br>イミフィング点滴静注液 (規格なし) :1500mg Day29 Day1  |
| 682 | Durvalumab (維持 7コース目以降)                          | 4コース終了後、Dur→Tre + Dur→Dur→Dur→・・・。                                     | 1  | 27 | 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1<br>大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1<br>イミフィング点滴静注液500mg:1500mg Day1   |
| 683 | Tremelimumab + Durvalumab + CBDCA + PEM (導入)     | 投与7日前にメ®コ®ル®注1mg筋注 (3コース毎に1回程度) , 投与7日前よりパ®ン®タ®ン®1g内服 (連日服用) ,ア®レ®タ®併用 | 1  | 20 | グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リ®酸®イ®テ®ル®8mg相当) :1瓶 Day1<br>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg /A Day1<br>生理食塩液PL「フ®」(100mL/瓶):1瓶 Day1<br>イ®ジ®ユ®ド®点滴静注25mg(1.25mL/瓶):75mg Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1<br>大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1<br>イミフィング点滴静注液 (規格なし) :1500mg Day1<br>ペ®メ®ト®レ®キ®セ®ド®点滴静注液「ト®」 (規格なし) :500mg /ml Day1  |

|     |   |  |    |    |   |
|-----|---|--|----|----|---|
| 684 | Tremelimumab+Durvalumab+CDDP+PEM (導入, ショート) | ア°比°タト(day1:125mg, day2,3:80mg) 併用。投与7日前にメチコルニル注1mg筋注, 投与7日よりパ°ン°タ°1g内服。 | 1  | 20 | <p>生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1<br/> パ°ロ°レ°ト°点滴静注バ°ツガ°0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液6.6mg (リウ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1<br/> デキサート注射液1.65mg (リウ酸エステル2mg) (0.5mL管):2管 Day1<br/> 生食 (500mL瓶):1瓶 Day1<br/> シスプラチン点滴静注 (規格なし):75m g/m Day1<br/> 生食 (100mL瓶):1瓶 Day1<br/> ペメトレキセド点滴静注液「トー」 (規格なし):500m g/m Day1<br/> イジユド点滴静注25mg(1.25mL/瓶):75m g Day1<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1<br/> 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1<br/> イミフィンジ点滴静注液 (規格なし):1500m g Day1<br/> ソルデム1輸液 (500mL袋):1袋 Day1<br/> 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管):10m L Day1<br/> アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 (10mL):1キット Day1<br/> 大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br/> 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋):200m L Day1</p> |
| 685 | Tremelimumab+Durvalumab+PEM (維持 5・6コース目)    | イミフィンジ°は体重30kg以下の場合20mg/kg。4コース終了後、Dur→Tre+Dur→Dur→Dur→・・・。              | 29 | 27 | <p>大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1<br/> イミフィンジ点滴静注液 (規格なし):1500m g Day1 Day29<br/> 生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day29 Day1<br/> イジユド点滴静注25mg:75m g Day29<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day29<br/> 大塚生食注(250mL):1袋 Day29<br/> グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day29<br/> デキサート注射液6.6mg (リウ酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day1 Day29<br/> ペメトレキセド点滴静注液「トー」 (規格なし):500m g/m Day1 Day29</p>  |
| 686 | Durvalumab+PEM (維持 7コース目以降)                 | イミフィンジ°は体重30kg以下の場合20mg/kg。投与7日前にパ°ン°タ°1g(連日)・メチコルニル注1mg筋注 (3コース毎に1回程度)  | 1  | 27 | <p>大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1<br/> イミフィンジ点滴静注液 (規格なし):1500m g Day1<br/> 生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1<br/> グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br/> デキサート注射液6.6mg (リウ酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day1<br/> ペメトレキセド点滴静注液「トー」 (規格なし):500m g/m Day1</p>   |

|     |                                     |   |    |    |  |
|-----|-------------------------------------|---|----|----|--|
| 691 | Pembrolizumab+CDDP+PEM (3-トリプトレシオン) | ア°比°タト(day1:125mg, day2,3:80mg) 併用。投与7日前にメチコルニル注1mg筋注, 投与7日前よりパ°ン°タ°1g内服。 | 1  | 20 | 生食(100mL瓶):1瓶 Day1<br>パ°ン°タ°点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイク」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1<br>デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg) (0.5mL管):2管 Day1<br>生食(500mL瓶):1瓶 Day1<br>シスプラチン点滴静注(規格なし):75m g/m Day1<br>生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1<br>キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL):200m g Day1<br>ペメトレキセド点滴静注「トー」(規格なし):500m g/m Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br>ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管):10m L Day1<br>アスバラギン酸カリウム注10mEqキッド「フレ」(10mL):1キッド Day1<br>20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200m L Day1 |
| 700 | Nivolumab+ CBDCA+PTX                | ア°比°タト (day1:125mg, day2~3:80mg) 併用。以タミ5錠内服。                              | 1  | 20 | 生食(100mL):1瓶 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):2瓶 Day1<br>デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg相当):2管 Day1<br>ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>生食(500mL):1瓶 Day1<br>バクリタキセル注「ネビ°ー」(規格なし):175m g/m Day1<br>大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1<br>カルボプラチン点滴静注(規格なし):0m g/A Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1<br>生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1<br>オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶):1瓶 Day1<br>オブジーボ点滴静注120mg (12mL瓶):1瓶 Day1   |
| 410 | DOC                                 |   | 1  | 20 | グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1<br>大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1<br>ドセタキセル点滴静注「ニコ」(規格なし):60m g/m Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1   |
| 420 | PEM                                 | 投与7日前にメチコルニル注1mg筋注(3回毎に1回程度), 投与7日前よりパ°ン°タ°1g内服(連日服用)。                    | 1  | 20 | 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1<br>生食(100mL):1瓶 Day1<br>ペメトレキセド点滴静注「トー」(規格なし):500m g/m Day1   |
| 430 | GEM                                 |   | 15 | 13 | グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15 Day8<br>デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day15 Day8<br>生食(100mL):1瓶 Day1 Day15 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注(規格なし):1000m g/m Day1 Day15 Day8<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day15 Day8  |

|     |                           |                              |   |    |   |
|-----|---------------------------|------------------------------|---|----|---|
| 440 | Weekly CPT-11             | 1週間毎に3~4回投与し、少なくとも2週間休薬。     | 1 | 6  | グラセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1<br>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1<br>イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト7」(規格なし) :100mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1   |
| 450 | VNR                       |                              | 8 | 13 | 生食 (100mL) :1瓶 Day8 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day1<br>ロゼウス静注液 (規格なし) :25mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day8 Day1  |
| 460 | AMR                       |                              | 3 | 18 | 大塚生食注(50mL/袋):20mL Day3 Day1 Day2<br>カルセド注射用 (規格なし) :45mg/m <sup>2</sup> Day3 Day1 Day2<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day3 Day1 Day2<br>グラセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3<br>デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3  |
| 470 | Topotecan                 |                              | 5 | 16 | 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>生食 (100mL) :1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>ハイカムチン注射用 1.1mg :1mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 Day5 Day1<br>グラセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5          |
| 500 | GEM+VNR                   |                              | 8 | 13 | グラセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8<br>デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8<br>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8<br>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8<br>ロゼウス静注液 (規格なし) :25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 |
| 510 | Bevacizumab (maintenance) | パバシズマブは2回目60分, 3回目以降30分に短縮可。 | 1 | 20 | 生食 (100mL) :1瓶 Day1<br>パバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):15mg/kg Day1   |
| 520 | nab-PTX (weekly)          |                              | 1 | 6  | 生食 (100mL) :1瓶 Day1<br>デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1<br>アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1<br>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1   |

|     |                            |   |    |    |   |
|-----|----------------------------|---|----|----|---|
| 530 | DOC + Ramucirumab          | サイラムザの投与時間は初回60分, 2回目以降30分に短縮可。                               | 1  | 20 | <p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1<br/> デキサート注射液6.6mg (リ酸エテル8mg相当) :1瓶 Day1<br/> ポラミン注 5mg:1管 Day1<br/> 大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br/> サイラムザ点滴静注用 (規格なし) :10mg g/kg Day1<br/> 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1<br/> ドセタキセル点滴静注「ニコ」 (規格なし) :60mg g/m<sup>2</sup> Day1<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1</p>   |
| 540 | Ramucirumab + EGFR-TKI     | サイラムザの投与時間は初回60分, 2回目以降30分に短縮可。エルロチニブ150mg or ゲフィチニブ250mg 併用。 | 1  | 13 | <p>生食 (100mL) :1瓶 Day1<br/> ポラミン注 5mg:1管 Day1<br/> 大塚生食注(250mL):1袋 Day1<br/> サイラムザ点滴静注用 (規格なし) :10mg g/kg Day1<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1</p>   |
| 560 | Tarlatamab (1コース目)         |   | 15 | 13 | <p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15<br/> 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8<br/> デキサート注射液6.6mg (リ酸エテル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 Day8<br/> 大塚生食注(250mL/袋):236m L Day1<br/> 注射用水 (20mL/管) :1.3m L Day1<br/> イムデトラ点滴静注用 1mg/瓶:1瓶 Day1<br/> テルモ生食(1000mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15<br/> 大塚生食注(250mL/袋):233m L Day8 Day15<br/> 注射用水 (20mL/管) :4.4m L Day8 Day15<br/> イムデトラ点滴静注用 10mg/瓶:1瓶 Day8 Day15</p> |
| 561 | Tarlatamab (2コース目以降)       |   | 15 | 13 | <p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day15<br/> 大塚生食注(250mL/袋):233m L Day15<br/> 注射用水 (20mL/管) :4.4m L Day15<br/> イムデトラ点滴静注用 10mg/瓶:1瓶 Day15</p>  |
| 562 | Tarlatamab (10mg, q2w ver) |   | 1  | 13 | <p>生食 (100mL) :1瓶 Day1<br/> 大塚生食注(250mL/袋):233m L Day1<br/> 注射用水 (20mL/管) :4.4m L Day1<br/> イムデトラ点滴静注用 10mg/瓶:1瓶 Day1</p>   |