

レジメナー覧					2026/02/24 時点
コード	レジメナー名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
310	Trastuzumab (初回)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイター」 (規格なし) :8m g/kg Day1
311	Trastuzumab (2回目以降)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイター」 (規格なし) :6m g/kg Day1
330	Weekly PTX+ Trastuzumab (初回)	ビタミン5錠内服。	15	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ネビラ」 (規格なし) :80m g/m Day1 Day8 Day15 注射用水 (20mL管) :0.19m L/kg Day1 Day8 Day15 トラスツマブB S点滴静注用「ファイター」 (規格なし) :4m g/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイター」 (規格なし) :2m g/kg Day8 Day15
331	Weekly PTX+ Trastuzumab (2回目以降)	ビタミン5錠内服。	15	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ネビラ」 (規格なし) :80m g/m Day1 Day8 Day15 注射用水 (20mL管) :0.095m L/kg Day1 Day8 Day15 トラスツマブB S点滴静注用「ファイター」 (規格なし) :2m g/kg Day1 Day8 Day15
362	TC75+ Trastuzumab (初回)		1	20	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニコ」 (規格なし) :75m g/m Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:600m g/m Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイター」 (規格なし) :8m g/kg Day1

363	TC75 + Trastuzumab (2回目以降)		1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1          グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1          ドセタキセル点滴静注「コア」(規格なし) :75mg/m<sup>2</sup> Day1          大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1          注射用エンドキサン500mg:600mg/m<sup>2</sup> Day1          注射用水(20mL管) :0.285m L/kg Day1          トラスツズマブB S点滴静注用「ファイター」(規格なし) :6mg/kg Day1</p>
372	DOC75 + Trastuzumab (初回)		1	20	<p>生食(100mL) :1瓶 Day1          グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1          大塚生食注(250mL):1袋 Day1          ドセタキセル点滴静注「コア」(規格なし) :75mg/m<sup>2</sup> Day1          注射用水(20mL管) :0.38m L/kg Day1          トラスツズマブB S点滴静注用「ファイター」(規格なし) :8mg/kg Day1</p>
373	DOC75 + Trastuzumab (2回目以降)		1	20	<p>生食(100mL) :1瓶 Day1          グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1          大塚生食注(250mL):1袋 Day1          ドセタキセル点滴静注「コア」(規格なし) :75mg/m<sup>2</sup> Day1          注射用水(20mL管) :0.285m L/kg Day1          トラスツズマブB S点滴静注用「ファイター」(規格なし) :6mg/kg Day1</p>
382	DOC75 + Trastuzumab + Pertuzumab (初回)		1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1          グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1          ドセタキセル点滴静注「コア」(規格なし) :75mg/m<sup>2</sup> Day1          注射用水(20mL管) :0.38m L/kg Day1          トラスツズマブB S点滴静注用「ファイター」(規格なし) :8mg/kg Day1          パージェタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1</p>
383	DOC75 + Trastuzumab + Pertuzumab (2回目以降)		1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1          グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1          ドセタキセル点滴静注「コア」(規格なし) :75mg/m<sup>2</sup> Day1          注射用水(20mL管) :0.285m L/kg Day1          トラスツズマブB S点滴静注用「ファイター」(規格なし) :6mg/kg Day1          パージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1</p>
384	Trastuzumab + Pertuzumab (初回)		1	20	<p>生食(100mL) :1瓶 Day1          大塚生食注(250mL):1袋 Day1          注射用水(20mL管) :0.38m L/kg Day1          トラスツズマブB S点滴静注用「ファイター」(規格なし) :8mg/kg Day1          パージェタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1</p>

385	Trastuzumab + Pertuzumab (2回目以降)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイター」(規格なし) :6m g/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1
390	T-DM1 (Trastuzumab Emtansine)	初回90分かけて投与し、忍容性がよければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.18m L/kg Day1 カドサイラ点滴静注用 (規格なし) :3.6m g/kg Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1
400	T-DM1 (Trastuzumab Emtansine) (術後:上限14コース)	初回90分かけて投与し、忍容性がよければ2回目以降は30分間まで短縮可。上限14コース。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.18m L/kg Day1 カドサイラ点滴静注用 (規格なし) :3.6m g/kg Day1
410	Trastuzumab deruxtecan	アプロチン (day1:125mg, day2~3:80mg) 併用。初回90分、忍容性がよければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	ブドウ糖注射液5% (100mL瓶) :1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 注射用水 (20mL管) :0.27m L/kg Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:5.4m g/kg Day1
421	TCbHP (初回)	アプロチン (day1:125mg, day2-3:80mg) 併用。6コースまで。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイター」(規格なし) :8m g/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニコ」(規格なし) :75m g/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0m g/A Day1
422	TCbHP (2回目以降)	アプロチン (day1:125mg, day2-3:80mg) 併用。6コースまで。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイター」(規格なし) :6m g/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニコ」(規格なし) :75m g/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0m g/A Day1

431	Eriburin+ Tmab+ Pmab (1コース目)		8	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 ハラヴェン静注1mg:1.4m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし) :8m g/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1
432	Eriburin+ Tmab+ Pmab (2コース目以降)		8	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 ハラヴェン静注1mg (2mL瓶) :1.4m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし) :6m g/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1
433	(後発品) Eriburin+ Tmab+ Pmab (1コース目)		8	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注1mg「日医工」(2mL/瓶):1.4m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし) :8m g/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1
434	(後発品) Eriburin+ Tmab+ Pmab (2コース目以降)		8	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注1mg「日医工」(2mL/瓶):1.4m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし) :6m g/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1
510	(SC)フェスゴIN (初回)	大腿部に皮下投与。初回30分経過観察し、忍容性よければ2回目以降の経過観察は15分間まで短縮可。	1	20	フェスゴ配合皮下注IN(15mL/瓶):1瓶 Day1
511	(SC)フェスゴMA (2回目以降)	大腿部に皮下投与。初回30分経過観察し、忍容性よければ2回目以降の経過観察は15分間まで短縮可。	1	20	フェスゴ配合皮下注MA(10mL/瓶):1瓶 Day1
520	DOC75+フェスゴIN (初回)		1	20	フェスゴ配合皮下注IN(15mL/瓶):1瓶 Day1 グラセトロン点滴静注液/バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コア」(規格なし) :75m g/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1

521	DOC75 + フェスゴMA (2回目以降)		1	20	フェスコ配合皮下注MA(10mL/瓶):1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コブ」(規格なし) :75mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
530	TCb + フェスゴIN (初回)	ア°ビ°タト (day1:125mg,day2-3:80mg) 併用。6コースまで。	1	20	フェスコ配合皮下注IN(15mL/瓶):1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コブ」(規格なし) :75mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1
531	TCb + フェスゴMA (2回目以降)	ア°ビ°タト (day1:125mg,day2-3:80mg) 併用。6コースまで。	1	20	フェスコ配合皮下注MA(10mL/瓶):1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コブ」(規格なし) :75mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1
540	Eriburin + フェスゴIN (1コース目)	大腿部に皮下投与。初回30分経過観察し、忍容性よければ2回目以降の経過観察は15分間まで短縮可。	8	13	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 ハラヴェン静注1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 フェスコ配合皮下注IN(15mL/瓶):1瓶 Day1
541	Eriburin + フェスゴMA (2コース目以降)	大腿部に皮下投与。初回30分経過観察し、忍容性よければ2回目以降の経過観察は15分間まで短縮可。	8	13	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 ハラヴェン静注1mg:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 フェスコ配合皮下注MA(10mL/瓶):1瓶 Day1
542	(後発品) Eriburin + フェスゴIN (1コース目)	大腿部に皮下投与。初回30分経過観察し、忍容性よければ2回目以降の経過観察は15分間まで短縮可。	8	13	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」(2mL/瓶):1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 フェスコ配合皮下注IN(15mL/瓶):1瓶 Day1
543	(後発品) Eriburin + フェスゴMA (2コース目以降)	大腿部に皮下投与。初回30分経過観察し、忍容性よければ2回目以降の経過観察は15分間まで短縮可。	8	13	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」(2mL/瓶):1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 フェスコ配合皮下注MA(10mL/瓶):1瓶 Day1

20	EC100	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	1	20	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パ°ロ°レト°点滴静注バ°ツク° 0.75mg/50mL「タイク」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 塩酸エビルピシン注 (規格なし) :100m g/m Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 mg:600m g/m Day1
21	EC60	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	1	20	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パ°ロ°レト°点滴静注バ°ツク° 0.75mg/50mL「タイク」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 塩酸エビルピシン注 (規格なし) :60m g/m Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 mg:600m g/m Day1
22	dose dense EC90	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	1	13	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パ°ロ°レト°点滴静注バ°ツク° 0.75mg/50mL「タイク」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 塩酸エビルピシン注 (規格なし) :90m g/m Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 mg:600m g/m Day1
40	Weekly PTX	メスタミン錠内服。	15	13	生食 ( 1 0 0 m L ) :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ネビ°-ラ」 (規格なし) :80m g/m Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注液バツグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15
41	Weekly PTX + Bevacizumab	メスタミン錠内服。ベ°バ°シズマブ°の投与時間は初回90分, 2回目以降60分に短縮可。	15	13	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 生食 ( 1 0 0 m L ) :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ネビ°-ラ」 (規格なし) :80m g/m Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注液バツグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 ベ°バ°シズマブ°BS点滴静注用「CTNK」(規格なし):10m g/kg Day1 Day15

42	dose dense PTX	2週毎、4コース行う。フィルター付き輸液セットを使用する。リストミン5錠内服。	1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リノ酸エステル8mg相当）：2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リノ酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 生食（500mL瓶）：1瓶 Day1 パクリタキセル注「ネビラ」(規格なし)：175mg/g/m <sup>2</sup> Day1 グラネセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1
61	DOC75		1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 グラネセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リノ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニコ」(規格なし)：75mg/g/m <sup>2</sup> Day1
70	VNR		8	13	大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 Day8 生食（100mL）：1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg（リノ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day1 Day8 ロゼウス静注液（規格なし）：25mg/g/m <sup>2</sup> Day1 Day8
80	GEM		8	13	グラネセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg（リノ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 Day8 生食（100mL）：1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）：1250mg/g/m <sup>2</sup> Day1 Day8
91	TC75（Docetaxel + Cyclophosphamide）		1	20	大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 グラネセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リノ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニコ」(規格なし)：75mg/g/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg：600mg/g/m <sup>2</sup> Day1
110	nab-PTX		1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg：260mg/g/m <sup>2</sup> Day1
120	Eriburin		8	13	大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day1 Day8 ハラゲン静注1mg：1.4mg/g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg（リノ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 Day8
121	（後発品） Eriburin		8	13	大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」(2mL/瓶)：1.4mg/g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg（リノ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 Day8

130	Atezolizumab + nab-PTX	テセントリクは初回60分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。	15	13	生食（100mL）:1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day15 テセントリク点滴静注840mg（14mL瓶）:1瓶 Day1 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day15 生食（100mL瓶）:1瓶 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg/瓶:100mg/g/m Day8 Day15
140	Pembrolizumab + Weekly PTX	レスタミン錠内服。	71	13	生食（100mL瓶）:1瓶 Day1 Day22 Day43 Day64 グラニセトロン点滴静注液/バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64 バクリタキセル注「ネビラ」(規格なし):90mg/g/m Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64 生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8 Day22 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64 キイトルーダ点滴静注100mg（100mg/4mL）:200mg/g Day1 Day22 Day43 Day64
141	Pembrolizumab + GC		8	13	生食（100mL瓶）:1瓶 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注液/バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液5%（100mL瓶）:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」（規格なし）:1000mg/g/m Day1 Day8 生食（100mL）:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg（100mg/4mL）:200mg/g Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/g/A Day1 Day8
142	Pembrolizumab + nab-PTX		71	13	生食（100mL瓶）:1瓶 Day1 Day22 Day43 Day64 生食（100mL）:1瓶 Day1 Day22 Day43 Day64 キイトルーダ点滴静注100mg（100mg/4mL）:200mg/g Day1 Day22 Day43 Day64 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day43 Day57 Day64 Day71 Day1 Day15 Day29 Day36 生理食塩液PL「アール」(100mL/瓶):1瓶 Day43 Day57 Day64 Day71 Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 アブラキサン点滴静注用100mg/瓶:100mg/g/m Day43 Day57 Day64 Day71 Day1 Day8 Day15 Day29 Day36

150	Sacituzumab govitecan (≥350mg)	ア°ビ°タト併用。前投薬はカナル。ト°ル°の投与時間は初回3時間、2回目以降1時間に短縮可。	8	13	生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day1 Day8 ファミチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 ポララミン注5mg (1mL管):1管 Day1 Day8 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 Day8 ト°ル°ビ°点滴静注用200mg/瓶:10m g /kg Day1 Day8
151	Sacituzumab govitecan (<350mg)	ア°ビ°タト併用。前投薬はカナル。ト°ル°の投与時間は初回3時間、2回目以降1時間に短縮可。	8	13	生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day1 Day8 ファミチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 ポララミン注5mg (1mL管):1管 Day1 Day8 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 Day8 ト°ル°ビ°点滴静注用200mg/瓶:10m g /kg Day1 Day8
160	Datopotamab Deruxtecán	前投与はカナル500mg。 ア°ビ°タト併用。ダ°ロ°ウ°エイの投与時間は初回90分、2回目以降30分まで短縮可。	1	20	ブドウ糖注射液5% (100mL/瓶):1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day1 ポララミン注5mg (1mL管):1管 Day1 注射用水 (20mL/管):0.3m L/kg Day1 ダ°ロ°ウ°エイ点滴静注用100mg/瓶:6m g /kg Day1
143-1	TCb+ Pembrolizumab	ア°ビ°タト (day1:125mg,day2-3:80mg) 併用。術前4コ-ス実施後、EC+Pembroへ。リノ酸5錠内服。	15	6	大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファミチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 バクシタキセル注「ルビ°-ラ」(規格なし):80m g /m Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし):0m g /A Day1 生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 キ°トル°ダ°点滴静注100mg (100mg/4mL):200m g Day1
143-2	EC+ Pembrolizumab	ア°ビ°タト (day1:125mg, day2~3:80mg) 併用。術前TCb+Pembro 4コ-ス実施後に使用。術後Pembro 9コ-スへ。	1	20	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ロ°セ°ト°点滴静注液バッグ0.75mg/50mL「タ°林」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg相当):2管 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 塩酸エリルピシン注 (規格なし):90m g /m Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 mg:600m g /m Day1 生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 キ°トル°ダ°点滴静注100mg (100mg/4mL):200m g Day1

143-3	Pembrolizumab (q3w)	術前TCb+Pembro 4J-入→EC+Pembro 4J-入後、術後、本剤のみの9J-入実施する。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg (100mg/4mL) :200mg Day1
10	EDP+mitotane	mitotane 併用。アプロビタト (day3 : 125mg, day4-5 : 80mg) 併用。適応外使用について薬剤部→倫理委員会報告	4	24	生食 (500mL瓶) :1瓶 Day3 Day4 Day2 イトボシド点滴静注液100mg「サト」 (5mL瓶) :100mg/m <sup>2</sup> Day3 Day4 Day2 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :200mL Day3 Day4 ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day3 Day4 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day3 Day4 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 (10mL) :10mL Day3 Day4 生食 (500mL) :1瓶 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :40mg/m <sup>2</sup> Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day4 Day1 Day3 デキサート注射液6.6mg (リコ酸17.78mg相当) :1瓶 Day4 Day1 Day2 Day3 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :40mg/m <sup>2</sup> Day1