

レジメン一覧					2026/02/24 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休業 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
10	S1+CDDP	テー-イスワは80mg/m2をday1～21経口投与（3週投与2週休業）。ア°ビ°タト（day8～10）併用。	3	32	ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液（500mL袋）：1袋 Day1 パ°ロ°ト°点滴静注バ°ッガ0.75mg/50mL「タイ初」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リ°酸°ス°ル°8mg相当）：1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リ°酸°ス°ル°2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注（規格なし）：60mg/m <sup>2</sup> Day1 20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10mL Day1
12	S1+DOC	テー-イスワは80mg/m2をday1～14経口投与（2週投与1週休業）。	1	20	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リ°酸°ス°ル°8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コ°」（規格なし）：40mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注（50mL/袋）：1袋 Day1
12.1	DOC		1	20	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リ°酸°ス°ル°8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コ°」（規格なし）：60mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注（50mL/袋）：1袋 Day1
15	PTX（Weekly）	リスタミン5錠内服。	15	13	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg（リ°酸°ス°ル°8mg相当）：1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」（20mL管）：1管 Day1 Day8 Day15 生食（1000mL）：1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注（250mL）：1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホ°」（規格なし）：80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注（50mL/袋）：1袋 Day1 Day8 Day15
27	Nab-PTX		1	20	生食（1000mL）：1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg：260mg/m <sup>2</sup> Day1
42	CapeOX	カ°シ°は2000mg/m2/dayをday1の夕からday15の朝まで内服（2週投与1週休業）。	1	20	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リ°酸°ス°ル°8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）：130mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注（50mL/袋）：1袋 Day1

43	SOX	EGFは80mg/m <sup>2</sup> /dayをday1 夕～day15 朝まで経口投与（2週投与1週休薬）。	1	20	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リ酸EGF8mg相当）:1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）:130mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
44	PTX+Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。	15	13	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg（リ酸EGF8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg:1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注用（規格なし）:8mg/kg Day1 Day15 パクリタキセル注「ネビラ」(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8 Day15
45	Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。	1	13	生食（100mL）:1瓶 Day1 ポラミン注 5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用（規格なし）:8mg/kg Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
46	Nab-PTX+Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。	15	13	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg（リ酸EGF8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg:1管 Day1 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day15 サイラムザ点滴静注用（規格なし）:8mg/kg Day1 Day15 生食（100mL瓶）:1瓶 Day1 Day8 Day15 アプタキサン点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15
53	mFOLFOX6		1	13	パクリタキセル点滴静注液バッグ0.75mg/50mL「タネ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リ酸EGF8mg相当）:1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）:85mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオロウラシル注100mg「ト」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1 フルオロウラシル注100mg「ト」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「ア」(20mL/管):1管 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト」(規格なし):200mg/m <sup>2</sup> Day1

55	Nivolumab + SOX	エトキシは80mg/m <sup>2</sup> /dayをday1 夕~day15 朝まで経口投与 (2週投与1週休薬)。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):130mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶):1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注120mg (12mL瓶):1瓶 Day1
56	Nivolumab + CapeOX	カペシタシンは2000mg/m <sup>2</sup> /dayをday1の夕からday15の朝まで内服 (2週投与1週休薬)。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):130mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶):1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注120mg (12mL瓶):1瓶 Day1
57	Nivolumab + mFOLFOX6		1	13	パロリセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL〔タイチ〕:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):85mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオロウラシル注1000mg〔トワ〕:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg〔トワ〕:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL〔フー〕(20mL/管):1管 Day1 レボホリナート点滴静注用〔トワ〕 (規格なし):200mg/m <sup>2</sup> Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶):1瓶 Day1
60	Ramucirumab+Irinotecan	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。UGT1A1遺伝子多型を有する患者は120mg/m <sup>2</sup>	1	13	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day1 ボラミン注5mg (1mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用 (規格なし):8mg/kg Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 大塚糖液5% (250mL/袋):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液〔トワ〕 (規格なし):150mg/m <sup>2</sup> Day1
48-1	Nivolumab (q2w)		1	13	生食 (100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶):1瓶 Day1
48-2	Nivolumab (q4w)		1	27	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶):2瓶 Day1 生食 (100mL):1瓶 Day1

20	Trastuzumab (初回)	胃癌に対しては、ルセツチ単剤での投与不可 (他の抗悪性腫瘍剤との併用が必要)。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイバー」 (規格なし) :8m g/kg Day1
21	Trastuzumab (2回目以降)	胃癌に対しては、ルセツチ単剤での投与不可 (他の抗悪性腫瘍剤との併用が必要)。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイバー」 (規格なし) :6m g/kg Day1
54	Trastuzumab Deruxtecan	アプレクタは主治医判断。初回90分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	ブドウ糖注射液5% (100mL瓶) :1瓶 Day1 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイレ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 注射用水 (20mL管) :0.32m L/kg Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:6.4m g/kg Day1
29	CPT-11 + Trastuzumab (初回)	CPT-11は2週毎投与, Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイバー」 (規格なし) :8m g/kg Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トワ」 (規格なし) :150m g/m Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
30	CPT-11	2週毎投与。	1	0	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トワ」 (規格なし) :150m g/m Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
31	Trastuzumab (2回目以降)	3週毎投与。	1	0	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイバー」 (規格なし) :6m g/kg Day1
32	CPT-11 + Trastuzumab (2回目以降)	CPT-11は2週毎投与, Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイバー」 (規格なし) :6m g/kg Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トワ」 (規格なし) :150m g/m Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1

49	mFOLFOX6+Trastuzumab (初回)	mFOLFOX6 は2週ごと、Trastuzumab は3週ごとに投与する。	1	13	パロセチン点滴静注パップ 0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0mg「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0mg「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツマブ B S 点滴静注用「ファイター」 (規格なし) :8mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「トワ」 (規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1
50	mFOLFOX6 (Trastuzumab併用)	mFOLFOX6 は2週ごと、Trastuzumab は3週ごとに投与する。	1	6	パロセチン点滴静注パップ 0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0mg「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0mg「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1 レボホリナート点滴静注用「トワ」 (規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1
51	Trastuzumab (2回目以降)	胃癌：ルセチン単剤での投与不可 (他の抗悪性腫瘍剤と併用)。mFOLFOX6は2週ごと、Trastuzumabは3週ごと。	1	6	生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツマブ B S 点滴静注用「ファイター」 (規格なし) :6mg/kg Day1
52	mFOLFOX6+Trastuzumab (2回目以降)	mFOLFOX6 は2週ごと、Trastuzumab は3週ごとに投与する。	1	13	パロセチン点滴静注パップ 0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0mg「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0mg「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツマブ B S 点滴静注用「ファイター」 (規格なし) :6mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「トワ」 (規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1

61	Pembrolizumab + Trastuzumab + CapeOX (初回)	カペシタシンは2000mg/m <sup>2</sup> /dayを1日2回に分けてday1～14内服。	1 20	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130mg/g/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1  トラスツマブB S点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :8mg/kg Day1  生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1  キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1</p>
62	Pembrolizumab + Trastuzumab + CapeOX (2回目以降)	カペシタシンは2000mg/m <sup>2</sup> をday1～14内服。トラスツマブは初回の忍容性がよければ、2回目以降30分まで短縮可。	1 20	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130mg/g/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1  トラスツマブB S点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :6mg/kg Day1  生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1  キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1</p>
63	Pembrolizumab + Trastuzumab + FP (初回)	アピタクト (day1 : 125mg, day2～3 : 80mg) 併用。	5 23	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  ラクテック注 (500mL) :2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  フルオウラシル注 1000mg〔ト〕:800mg/g/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  パロチド点滴静注バッグ0.75mg/50mL〔タ体初〕:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg (リ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1  生食 (500mL) :1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg/g/m<sup>2</sup> Day1  ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1  20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day1  生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1  キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1  大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1  注射用水 (20mL/管) :0.38m L/kg Day1  トラスツマブBS点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :8mg/kg Day1</p>

64	Pembrolizumab + Trastuzumab + FP (2回目以降)	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。トラスツマブ°は初回の忍容性がよければ、30分まで短縮可。	5	23	生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL) :2袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオウラシル注 1000mg「ト°」:800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パ°ロ°ヒ°点滴静注「バ°」0.75mg/50mL「タイ°」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ°酸イ°ル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リ°酸イ°ル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 生理食塩液PL「フ°」(100mL/瓶):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 注射用水 (20mL/管) :0.285mL/kg Day1 トラスツマブBS点滴静注用「ファイ°」 (規格なし) :6mg/kg Day1
40	Trastuzumab (初回) + S1 + CDDP	テイ°イ°ク°は80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与 (2週投与1週休薬)。ア°ビ°タト (day1~3) 併用。	3	18	ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38mL/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイ°」 (規格なし) :8mg/kg Day1 パ°ロ°ヒ°点滴静注「バ°」0.75mg/50mL「タイ°」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ°酸イ°ル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リ°酸イ°ル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60mg/m <sup>2</sup> Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1
41	Trastuzumab (2回目以降) + S1 + CDDP	テイ°イ°ク°は80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与 (2週投与1週休薬)。ア°ビ°タト (day1~3) 併用。	3	18	ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285mL/kg Day1 トラスツマブB S点滴静注用「ファイ°」 (規格なし) :6mg/kg Day1 パ°ロ°ヒ°点滴静注「バ°」0.75mg/50mL「タイ°」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ°酸イ°ル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リ°酸イ°ル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60mg/m <sup>2</sup> Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1

18	Trastuzumab (初回) + S1 + CDDP	テー-イスワンは80mg/m <sup>2</sup> をday1~21経口投与 (3週投与2週休薬)。ア°ビ°タト (day8~10) 併用。	3	1	<p>ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3          硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1          大塚生食注(250mL):1袋 Day1          注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1          ハーセプチン注射用 (規格なし) :8m g/kg Day1          パ°ロ°ヒト°点滴静注パ°ック° 0.75mg/50mL「タイレ」:1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1          デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1          生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1          シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g/m<sup>2</sup> Day1          20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1</p>
19	Trastuzumab (2回目以降) + S1 + CDDP	テー-イスワンは80mg/m <sup>2</sup> をday1~21経口投与 (3週投与2週休薬)。ア°ビ°タト (day8~10) 併用。	3	1	<p>ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3          硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1          大塚生食注(250mL):1袋 Day1          注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1          トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイサ°」 (規格なし) :6m g/kg Day1          パ°ロ°ヒト°点滴静注パ°ック° 0.75mg/50mL「タイレ」:1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1          デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1          生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1          シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g/m<sup>2</sup> Day1          20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1</p>
22	S1 + CDDP	テー-イスワンは80mg/m <sup>2</sup> をday1~21経口投与 (3週投与2週休薬)。ア°ビ°タト (day8~10) 併用。	3	1	<p>ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3          硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1          パ°ロ°ヒト°点滴静注パ°ック° 0.75mg/50mL「タイレ」:1袋 Day1          デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1          デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1          生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1          シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g/m<sup>2</sup> Day1          20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1</p>
23	Trastuzumab (初回)	3週毎投与。	1	0	<p>生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1          大塚生食注(250mL):1袋 Day1          注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1          トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイサ°」 (規格なし) :8m g/kg Day1</p>
24	Trastuzumab (2回目以降)	3週毎投与。	1	0	<p>生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1          大塚生食注(250mL):1袋 Day1          注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1          トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイサ°」 (規格なし) :6m g/kg Day1</p>

46	SOX + Trastuzumab (初回)	テー-イスワンは80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与(2週投与1週休薬)。	1	20	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし):8mg/kg Day1
47	SOX + Trastuzumab (2回目以降)	テー-イスワンは80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与(2週投与1週休薬)。	1	20	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし):6mg/kg Day1
36	Weekly PTX + Trastuzumab (初回)	ビタミン5錠内服。PTXは3週投与1週休薬, Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし):8mg/kg Day1 パクリタキセル注「ネビラ」(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
37	Weekly PTX	ビタミン5錠内服。3週投与1週休薬。	1	0	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注「ネビラ」(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
38	Trastuzumab (2回目以降)	3週毎投与。	1	0	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし):6mg/kg Day1

39	Weekly PTX+Trastuzumab (2回目以降)	以タミ5錠内服。PTXは3週投与1週休薬, Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	<p>グラセトロン点滴静注液バグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1  トラスツズマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし) :6m g/kg Day1  バクワキセル注「ルビラ」(規格なし) :80m g/m Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1</p>
33	XP+Trastuzumab (初回)	カハシ死シ2000mg/m2分2をday1~14投与 (2週投与1週休薬)。アッビタト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	3	18	<p>ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1  トラスツズマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし) :8m g/kg Day1  バロレト点滴静注バグ0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1  生食 (500mL) :1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g/m Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :1袋 Day1</p>
34	XP+Trastuzumab (2回目以降)	カハシ死シ2000mg/m2分2をday1~14投与 (2週投与1週休薬)。アッビタト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	3	18	<p>ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1  トラスツズマブB S点滴静注用「ファイバー」(規格なし) :6m g/kg Day1  バロレト点滴静注バグ0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1  生食 (500mL) :1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g/m Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :1袋 Day1</p>
210	Zolbetuximab+CapeOX (初回 : 600mg≤体重≤1500mg)	カハシ死シ2000mg/m2/dayをday1夕~day15朝まで (2週投与1週休薬)。アッビタト (day1:125mg, day2~3:80mg)	1	20	<p>バロレト点滴静注バグ0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130m g/m Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1  注射用水 (20mL/管) :40m L/m Day1  ピロイ点滴静注用 (規格なし) :800m g/m Day1</p>

211	Zolbetuximab+CapeOX (初回 : 1500mg ≤ 体重 × 0.1)	体重 × 2000mg/m <sup>2</sup> /dayをday1夕～day15朝まで (2週投与1週休薬)。アプレタクト (day1:125mg, day2～3:80mg)	1	20	パロセトド点滴静注パツク 0.75mg/50mL「タレ初」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸17.8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 生理食塩液PL「フー」(500mL/瓶):1瓶 Day1 注射用水 (20mL/管) :40m L/m <sup>2</sup> Day1 ピロイ点滴静注用 (規格なし) :800mg/m <sup>2</sup> Day1
220	Zolbetuximab+CapeOX (2回目～ : 600mg < 体重 × 0.1 ≤ 1500mg)	体重 × 2000mg/m <sup>2</sup> /dayをday1夕～day15朝まで (2週投与1週休薬)。アプレタクト (day1:125mg, day2～3:80mg)	1	20	パロセトド点滴静注パツク 0.75mg/50mL「タレ初」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸17.8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 注射用水 (20mL/管) :30m L/m <sup>2</sup> Day1 ピロイ点滴静注用 (規格なし) :600mg/m <sup>2</sup> Day1
221	Zolbetuximab+CapeOX (2回目 : 1500mg ≤ 体重 × 0.1)	体重 × 2000mg/m <sup>2</sup> /dayをday1夕～day15朝まで (2週投与1週休薬)。アプレタクト (day1:125mg, day2～3:80mg)	1	20	パロセトド点滴静注パツク 0.75mg/50mL「タレ初」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸17.8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 生理食塩液PL「フー」(500mL/瓶):1瓶 Day1 注射用水 (20mL/管) :30m L/m <sup>2</sup> Day1 ピロイ点滴静注用 (規格なし) :600mg/m <sup>2</sup> Day1
31	Zolbe+mFOLFOX6 (初回:600mg ≤ 体重 × 0.1 < 1500mg)	アプレタクト (day1:125mg, day2～3:80mg)併用。	1	13	大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 パロセトド点滴静注パツク 0.75mg/50mL「タレ初」:1袋 Day1 ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸17.8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 注射用水 (20mL/管) :40m L/m <sup>2</sup> Day1 ピロイ点滴静注用 (規格なし) :800mg/m <sup>2</sup> Day1

32	Zolbe+mFOLFOX6 (初回:1500mg≦t°日)	ア°比°タト (day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	13	<p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:400mg/m Day1  生食 ( 1 0 0 m L ) :1瓶 Day1  フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:2400mg/m Day1  生理食塩液PL「フ」(20mL/管):1管 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m Day1  パ°ロセト°点滴静注ハ°ツク° 0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1  ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ°酸I°7°8mg相当) :1瓶 Day1  ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1  生理食塩液PL「フ」(500mL/瓶):1瓶 Day1  注射用水 (20mL/管) :40m L/m Day1  ピロイ点滴静注用 (規格なし) :800mg/m Day1</p>
41	Zolbe+mFOLFOX6 (2回目~:t°日<600mg)	ア°比°タト (day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	13	<p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:400mg/m Day1  生食 ( 1 0 0 m L ) :1瓶 Day1  フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:2400mg/m Day1  生理食塩液PL「フ」(20mL/管):1管 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m Day1  パ°ロセト°点滴静注ハ°ツク° 0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1  ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ°酸I°7°8mg相当) :1瓶 Day1  ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1  生理食塩液PL「フ」(100mL/瓶):1瓶 Day1  注射用水 (20mL/管) :20m L/m Day1  ピロイ点滴静注用 (規格なし) :400mg/m Day1</p>
42	Zolbe+mFOLFOX6 (2回目~:600mg≦t°日)	ア°比°タト (day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	13	<p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:400mg/m Day1  生食 ( 1 0 0 m L ) :1瓶 Day1  フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:2400mg/m Day1  生理食塩液PL「フ」(20mL/管):1管 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m Day1  パ°ロセト°点滴静注ハ°ツク° 0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1  ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ°酸I°7°8mg相当) :1瓶 Day1  ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1  大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1  注射用水 (20mL/管) :20m L/m Day1  ピロイ点滴静注用 (規格なし) :400mg/m Day1</p>