

# レジメン一覧

2026/02/24 時点

コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休業 期間	薬剤情報
					薬品名：数量 投与日
311	FOLFIRI + Biweekly-Cetuximab	Cetuximabは初回2時間、忍容性がよければ2回目以降は1時間に短縮可。	1	13	大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリリテカン塩酸塩点滴静注用「ト」 (規格なし) :150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フ」(20mL/管):1管 Day1 パロピト点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸イソ8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アーピタックス注射液 (規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1
312	CPT-11 + Biweekly-Cetuximab	Cetuximabは初回2時間、忍容性がよければ2回目以降は1時間に短縮可。	1	13	グラセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸イソ8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アーピタックス注射液 (規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリリテカン塩酸塩点滴静注用「ト」 (規格なし) :150mg/m <sup>2</sup> Day1
313	Biweekly Cetuximab	Cetuximabは初回2時間、忍容性がよければ2回目以降は1時間に短縮可。	1	13	生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸イソ8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アーピタックス注射液 (規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
314	mFOLFOX6 + Biweekly-Cetuximab	Cetuximabは初回2時間、忍容性がよければ2回目以降は1時間に短縮可。	1	13	大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (規格なし) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フ」(20mL/管):1管 Day1 パロピト点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸イソ8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アーピタックス注射液 (規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1

210	FOLFIRI		1	13	<p>パロピト点滴静注パツク0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注用「トク」(規格なし) :150mg/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  フルオロウラシル注1000mg「トク」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食(100mL) :1瓶 Day1  フルオロウラシル注1000mg「トク」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1  レボホリナート点滴静注用「トク」(規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
220	FOLFIRI + Bevacizumab	パバシズマブの投与時間は初回90分, 2回目以降60分に短縮可。	1	13	<p>パロピト点滴静注パツク0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注用「トク」(規格なし) :150mg/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  フルオロウラシル注1000mg「トク」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食(100mL) :1瓶 Day1  フルオロウラシル注1000mg「トク」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1  ペバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):5mg/kg Day1  レボホリナート点滴静注用「トク」(規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
230	FOLFIRI + Cetuximab (1J-λ目)		8	6	<p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注用「トク」(規格なし) :150mg/m<sup>2</sup> Day1  レボホリナート点滴静注用「トク」(規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1  パロピト点滴静注パツク0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8  ポララミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 Day8  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8  アービタックス注射液(規格なし):400mg/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8  フルオロウラシル注1000mg「トク」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食(100mL) :1瓶 Day1 Day8  フルオロウラシル注1000mg「トク」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  アービタックス注射液(規格なし):250mg/m<sup>2</sup> Day8</p>

231	FOLFIRI + Cetuximab (2回-1回目以降)		8	6	<p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  イリリテカン塩酸塩点滴静注用「ト」 (規格なし) :150mg/g/m<sup>2</sup> Day1  レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/g/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液PL「フ」(20mL/管):1管 Day1  パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8  ボラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 Day8  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8  アービタックス注射液 (規格なし):250mg/g/m<sup>2</sup> Day1 Day8  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8  フルオロウラシル注1000mg「ト」:400mg/g/m<sup>2</sup> Day1  生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8  フルオロウラシル注1000mg「ト」:2400mg/g/m<sup>2</sup> Day1</p>
240	FOLFIRI + Panitumumab		1	13	<p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  イリリテカン塩酸塩点滴静注用「ト」 (規格なし) :150mg/g/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト」:400mg/g/m<sup>2</sup> Day1  生食 (100mL) :1瓶 Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト」:2400mg/g/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液PL「フ」(20mL/管):1管 Day1  ペクティビックス点滴静注 (規格なし) :6mg/kg Day1  レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/g/m<sup>2</sup> Day1</p>
250	CPT-11 + Cetuximab (1回-1回目)		8	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8  アービタックス注射液 (規格なし):400mg/g/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  イリリテカン塩酸塩点滴静注用「ト」 (規格なし) :150mg/g/m<sup>2</sup> Day1  生食 (100mL) :1瓶 Day8  ボラミン注5mg (1mL管) :1管 Day8  アービタックス注射液 (規格なし):250mg/g/m<sup>2</sup> Day8</p>
251	CPT-11 + Cetuximab (2回-1回目以降)		8	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8  ボラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 Day8  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8  アービタックス注射液 (規格なし):250mg/g/m<sup>2</sup> Day1 Day8  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  イリリテカン塩酸塩点滴静注用「ト」 (規格なし) :150mg/g/m<sup>2</sup> Day1  生食 (100mL) :1瓶 Day8</p>

260	CPT-11 + Panitumumab		1	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 ペクティビックス点滴静注 (規格なし) :6mg/kg Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トウ」 (規格なし) :150mg/g/m <sup>2</sup> Day1
270	IRIS	テイ-スワは80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与 (2週投与2週休薬)。	15	13	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day15 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トウ」 (規格なし) :125mg/g/m <sup>2</sup> Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day15
280	SIR + Bevacizumab	ヘパシズマブの投与時間は初回90分, 2回目以降60分に短縮可。S1は80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与 (2投与1休)。	1	20	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トウ」 (規格なし) :150mg/g/m <sup>2</sup> Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 ヘパシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):7.5mg/kg Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
281	CapeIRI + Bevacizumab	ヘパシズマブは2回目60分, 3回目以降30分に短縮可。カペシピンは1600mg/m <sup>2</sup> /dayをday1~14経口投与 (2投与1休)。	1	20	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トウ」 (規格なし) :200mg/g/m <sup>2</sup> Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 ヘパシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):7.5mg/kg Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
290	FOLFIRI + Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分, 2回目以降30分に短縮可。	1	13	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注 5mg:1管 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トウ」 (規格なし) :150mg/g/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオウラシル注1000mg「トウ」:400mg/g/m <sup>2</sup> Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「トウ」:2400mg/g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用 (規格なし) :8mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注液「トウ」 (規格なし) :200mg/g/m <sup>2</sup> Day1

300	FOLFIRI + Aflibercept		1	13	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイク」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トウ」(規格なし) :180mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「トウ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「トウ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 ギルトラップ点滴静注 (規格なし) :4mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「トウ」(規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1
440	mFOLFOXIRI		1	13	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイク」:1袋 Day1 ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トウ」(規格なし) :150mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「トウ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート点滴静注用「トウ」(規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1
443	mFOLFOXIRI + Bevacizumab (導入療法)	最大12回。パロセトロン点滴静注の投与時間は初回90分,2回目以降60分,3回目以降30分に短縮可。	1	13	大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トウ」(規格なし) :150mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「トウ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m <sup>2</sup> Day1 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイク」:1袋 Day1 ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用「トウ」(規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 ペバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):5mg/kg Day1
444	modifiedFL + Bev (維持療法)	パロセトロン点滴静注の投与時間は初回90分,2回目60分,3回目以降30分に短縮可。	1	13	大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「トウ」(規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「トウ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ペバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):5mg/kg Day1

10	mFOLFOX6		1	13	<p>パロセト点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「夕林」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  フルオウラシル注 1 0 0 0mg「ト」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1  フルオウラシル注 1 0 0 0mg「ト」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液PL「フ」(20mL/管):1管 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
20	mFOLFOX6 + Bevacizumab	パバシマブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	1	13	<p>パロセト点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「夕林」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  フルオウラシル注 1 0 0 0mg「ト」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1  フルオウラシル注 1 0 0 0mg「ト」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液PL「フ」(20mL/管):1管 Day1  ベバシマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):5mg/kg Day1  レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
30	mFOLFOX6 + Panitumumab		1	13	<p>パロセト点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「夕林」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  フルオウラシル注 1 0 0 0mg「ト」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1  フルオウラシル注 1 0 0 0mg「ト」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液PL「フ」(20mL/管):1管 Day1  ペクティビクス点滴静注 (規格なし) :6mg/kg Day1  レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
40	FOLFOX4		2	12	<p>パロセト点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「夕林」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day2  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2  フルオウラシル注 1 0 0 0mg「ト」:400mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2  生食 (5 0 0 mL) :1瓶 Day1 Day2  フルオウラシル注 1 0 0 0mg「ト」:600mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2  生食 (2 0 mL) :1管 Day2  レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :100mg/m<sup>2</sup> Day2 Day1</p>

50	FOLFOX4 + Bevacizumab	ハバシズマブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	2	12	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「夕休」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day2 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85m g/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:400m g/m <sup>2</sup> Day1 Day2 生食 ( 5 0 0 m L ) :1瓶 Day1 Day2 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「ト」:600m g/m <sup>2</sup> Day1 Day2 生食 ( 1 0 0 m L ) :1瓶 Day1 ペバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):5m g/kg Day1 生食 ( 2 0 m L ) :1管 Day2 レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :100m g/m <sup>2</sup> Day2 Day1
60	CapeOX	カペシタビンは2000mg/m <sup>2</sup> をday1の夕からday15の朝まで内服 (2週投与1週休薬)。	1	20	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130m g/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
70	CapeOX + Bevacizumab	カペシタビンは2000mg/m <sup>2</sup> をday1の夕からday15の朝まで内服。ハバシズマブは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	1	20	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130m g/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 生食 ( 1 0 0 m L ) :1瓶 Day1 ペバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):7.5m g/kg Day1
80	SOX	テイロシタンは80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与 (2週投与1週休薬)。	1	20	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130m g/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
90	SOX + Bevacizumab	テイロシタンは80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与(2週投与1週休薬)。ハバシズマブは2回目60分、3回目~30分に短縮可。	1	20	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130m g/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 生食 ( 1 0 0 m L ) :1瓶 Day1 ペバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):7.5m g/kg Day1
410	Cetuximab (初回)		1	6	生食 ( 1 0 0 m L ) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ボラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アーピタックス注射液 (規格なし):400m g/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1

411	Cetuximab (2回目以降)		1	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (規格なし):250mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
415	Cetuximab (初回) + Encorafenib±Binimetinib		1	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (規格なし):400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
416	Cetuximab (2回目以降) + Encorafenib±Binimetinib		1	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (規格なし):250mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
420	Panitumumab		1	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 バクティビックス点滴静注 (規格なし) :6mg/kg Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
421	Panitumumab(デキサートあり)		1	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 バクティビックス点滴静注 (規格なし) :6mg/kg Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1
430	5FU + LV (sLV5FU2法)		1	13	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイク」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「トワ」 (規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオウラシル注1000mg「トワ」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「トワ」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フー」(20mL/管):1管 Day1
431	5FU + LV (RPMI法)	13-スは、週1回、6週連続投与2週休薬。	1	6	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「トワ」 (規格なし) :250mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオウラシル注1000mg「トワ」:600mg/m <sup>2</sup> Day1

450	FL + Bevacizumab (bolusあり)	ヘパシマブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	1	13	大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-」(規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「ト-」:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「ト-」:2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液PL「フ-」(20mL/管):1管 Day1 ヘパシマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):5mg/kg Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1
460	Bevacizumab+経口フッ化ピリミジン系抗がん薬	ヘパシマブは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	1	20	生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 ヘパシマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):7.5mg/kg Day1
470	Bevacizumab+トリフルリジン/チピラシル	ロンサーフは35mg/m <sup>2</sup> をday1~5,8~12まで内服。ヘパシマブは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	15	13	生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 Day15 ヘパシマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):5mg/kg Day1 Day15
480	Trastuzumab + Pertuzumab (初回) (大腸癌)	先行品のみに適応があるため、緊急採用願いが必要です。	1	20	生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38mL/kg Day1 ハーセプチン注射用 (規格なし) :8mg/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1
481	Trastuzumab + Pertuzumab (2回目以降) (大腸癌)	先行品のみに適応があるため、緊急採用願いが必要です。	1	20	生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285mL/kg Day1 ハーセプチン注射用 (規格なし) :6mg/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1
10	5FU + MMC + RT	マイトマイシン注10mgの緊急採用願いが必要	32	3	生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 Day29 ラクテック注 (5 0 0 mL) :1袋 Day1 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day4 ソルデム1輸液 (5 0 0 mL):1袋 Day1 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day4 フルオウラシル注 1 0 0 0 mg「ト-」:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day4 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day1 Day4 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day2 Day30 Day31 Day32 Day4 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day29 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day29 Day1 マイトマイシン注1 0 mg :10mg/m <sup>2</sup> Day29 Day1

11	5FU+MMC+RT (q4w)	マイトマイシン注用10mgの緊急採用願いが必要	4	24 生食 (100mL) :1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注 1000mg「ト-7」:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 Day1 Day3 Day4 デキサート注射液1.65mg (リ酸エステル2mg相当) :2管 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 マイトマイシン注用 10mg :10mg/m <sup>2</sup> Day1
----	------------------	-------------------------	---	--