

レジメン一覧					2026/02/24 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休業 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
18	Ramucirumab (肝)	サイラムザの投与時間は初回60分，2回目以降30分に短縮可。	1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 ボラミン注 5mg：1管 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用（規格なし）：8mg/kg Day1 大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day1
21	Atezolizumab+Bevacizumab	テセントリクの投与時間は、2回目以降30分に短縮可。アバスタンの投与時間は、2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	1	20	生食（100mL瓶）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶)：1200mg Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1 アバスタン点滴静注用(規格なし)：15mg/kg Day1
10	5FU+ I-LV		1	6	ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL：1筒 Day1 大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day1 フルオウラシル注 1000mg「ト」：400mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「ト」（規格なし）：200mg/m ² Day1
15	GC		8	13	ラクテック注（500mL）：1袋 Day1 Day8 パロセチン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレ」：1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg（リソ酸17.8mg相当）：1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注（規格なし）：25mg/m ² Day1 Day8 ブドウ糖注射液（5%100mL）：1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）：1000mg/m ² Day1 Day8 ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day1 Day8
19	GEM+S1 (胆道)	S1は体表面積に基づき60, 80, 100mg/body（60mg/m ² ）をday1～14経口投与（2週投与1週休業）。	8	13	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg（リソ酸17.8mg相当）：1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液（5%100mL）：1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）：1000mg/m ² Day1 Day8 大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day1 Day8

22-1	Durvalumab+GC	最大8回以降、9回以降からはDurvalumab（維持療法）へ移行する。イミフィングは体重30kg以下の場合20mg/kg。	8	13	ラクテック注（500mL）:1袋 Day1 Day8 パロセチド点滴静注バッグ0.75mg/50mL「夕林」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注（規格なし）:25mg/m ² Day1 Day8 ブドウ糖注射液（5%100mL）:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）:1000mg/m ² Day1 Day8 ソルデム3A輸液（500mL）:1袋 Day1 Day8 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 イミフィング点滴静注液500mg:1500mg Day1
22-2	Durvalumab（維持療法）	Durvalumab+GC療法後に使用。イミフィングは体重30kg以下の場合20mg/kg。	1	27	生食（100mL）:1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 イミフィング点滴静注液（規格なし）:1500mg Day1
11	GEM		15	13	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液（5%100mL）:1瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8 Day15
12	GEM+S1	サイタキスは80mg/m ² をday1～14経口投与（2週投与1週休薬）。	8	13	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液（5%100mL）:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）:1000mg/m ² Day1 Day8 生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8
14	FOLFIRINOX		1	13	大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）:85mg/m ² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トワ」（規格なし）:180mg/m ² Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トワ」:400mg/m ² Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トワ」:2400mg/m ² Day1 パロセチド点滴静注バッグ0.75mg/50mL「夕林」:1袋 Day1 ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg）（2mL管）:1瓶 Day1 生理食塩液PL「ワ」(20mL/管):1管 Day1 レボホリナート点滴静注用「トワ」（規格なし）:200mg/m ² Day1

15	nab-PTX + GEM		15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リ酸イソル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:125mg/m² Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m² Day1 Day8 Day15</p>
16	mFOLFIRINOX		1	13	<p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト」 (規格なし) :150mg/m² Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト」:2400mg/m² Day1 生理食塩液PL「フ」(20mL/管):1管 Day1 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「外」:1袋 Day1 ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸イソル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 レボリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m² Day1</p>
17	IRIS	<p>テイーイソは80mg/m²をday1~14経口投与 (2週投与2週休薬)。</p>	15	13	<p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「外」:1袋 Day15 デキサート注射液6.6mg (リ酸イソル8mg相当) :1瓶 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト」 (規格なし) :100mg/m² Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day15</p>
20	Nanoliposomal CPT-11+LV+5-FU	<p>UGT1A1*6 or UGT1A1*28 の純接合体、又は UGT1A1*6 及び UGT1A1*28 のヘテロ接合体を有する患者は50mg/m²開始</p>	1	13	<p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「外」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸イソル8mg相当) :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液5% (500mL袋) :1袋 Day1 オニバイド点滴静注43mg (10mL瓶) :70mg/m² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 レボリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :200mg/m² Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト」:2400mg/m² Day1 生理食塩液PL「フ」(20mL/管):1管 Day1</p>