

レジメン一覧					2026/02/24 時点	
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休業 期間	薬剤情報	
					薬品名：数量 投与日	
21	Temsirolimus		1	6	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 ボラミン注 5mg:1管 Day1 生食（250mL）：1瓶 Day1 トーリセル点滴静注液25mg:25mg Day1	
23	Nivolumab + Ipilimumab	導入療法（3週毎の4コース）と、維持療法（2週毎または4週毎）の2段階で行う。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg（24mL瓶）：1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):20mL Day1 ヤーボイ点滴静注液50mg:1mg/kg Day1	
28	Avelumab+Axitinib	インライタ併用。ルート確保時、レスタミン50mg、カロナール500mg（又は同等の薬剤）を内服。	1	13	生食（100mL瓶）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パベンチオ点滴静注200mg(10mL/瓶):10mg/kg Day1	
22-1	Nivolumab（q2w）		1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg（24mL瓶）：1瓶 Day1	
26-1	Pembrolizumab（q3w） + Axitinib	アキシチニブは1日2回連日経口投与。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg（100mg/4mL）：200mg Day1	
29-1	Pembrolizumab（q3w） + Lenvatinib	レンパチニブは1日1回連日経口投与。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg（100mg/4mL）：200mg Day1	
22-2	Nivolumab（q4w）		1	27	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg（24mL瓶）：2瓶 Day1	
26-2	Pembrolizumab（q6w） + Axitinib	アキシチニブは1日2回連日経口投与。	1	41	生食（100mL）：1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg（100mg/4mL）：400mg Day1	
29-2	Pembrolizumab（q6w） + Lenvatinib	レンパチニブは1日1回連日経口投与。	1	41	生食（100mL）：1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg（100mg/4mL）：400mg Day1	

19	CBDCA単剤 (ミノマ I 期)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 パロセトド点滴静注「パッガ」0.75mg/50mL「夕休」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg /A Day1
15	Cabazitaxel	投与開始日よりプレドニン10mg (1回5mg, 1日2回朝と昼) 連日服用。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ジエブタナ点滴静注60mg:25mg g/m ² Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 ボラミン注 5mg:1管 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
10月1日	DOC		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コプロ」 (規格なし) :70mg /m ² Day1
10月2日	DOC (DEXあり)		1	20	生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コプロ」 (規格なし) :70mg /m ² Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
11	GC	アロピカタ (day2 : 125mg, day3~4 : 80mg) 併用。	8	13	生理食塩液PL「フー」(500mL/瓶):1瓶 Day3 Day4 Day2 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day3 Day4 Day2 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5% 100mL) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg /m ² Day1 Day8 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day2 パロセトド点滴静注「パッガ」0.75mg/50mL「夕休」:1袋 Day2 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day2 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day2 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day2 生食 (500mL) :1瓶 Day2 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :70mg /m ² Day2 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day2
12	GEM		8	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5% 100mL) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg /m ² Day1 Day8

13	M-VAC	ア°ビ°タト (day2 : 125mg, day3,4 : 80mg) 併用。 day1, 15, 22の13時, 16時, 19時, 22時に0.1%リ 5mg2錠内服	22	6	<p>ヴェーンD輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 メイロン (7%20mL) :1管 Day1 Day15 Day22 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 注射用メソトレキセート (規格なし) :30mg/m² Day1 Day15 Day22 ラクテックG輸液 (500mL) :1袋 Day15 Day22 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day15 Day22 エクザール注射用 10mg :3mg/m² Day15 Day22 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day2 Day3 Day4 ドキソリピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :30mg/m² Day2 パロセチン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイチ」:1袋 Day2 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day2 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day2 生食 (500mL) :1瓶 Day2 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :70mg/m² Day2 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :200mL Day2</p>
17	GEM + PTX	day1 (ハ°カタセルの投与30分前までに) リスタミン5錠内服。	8	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100mL) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m² Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ネト°ラ」 (規格なし) :175mg/m² Day1</p>
27	Avelumab	ア°ラ併用一次化学療法後の維持療法。ルート確保時レスタミン50mg、カロナール500mg (又は同等の薬剤) 内服。	1	13	<p>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パベンチオ点滴静注200mg(10mL/瓶):10mg/kg Day1</p>
31	Enfortumab Vedotin		15	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 注射用水 (20mL管) :0.125mL/kg Day1 Day8 Day15 バドセブ点滴静注用 (規格なし):1.25mg/kg Day1 Day8 Day15</p>
32	Enfortumab Vedotin + Pembrolizumab (q3w)		8	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 注射用水 (20mL管) :0.125mL/kg Day1 Day8 バドセブ点滴静注用 (規格なし):1.25mg/kg Day1 Day8 生理食塩液PL「ア°」(100mL/瓶):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1</p>

40	Durvalumab+GC(60≤CCr)	ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。イミフヅ°は体重30kg以下の場合20mg/kg。4コース目まで。	8	13	生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day8 ブドウ糖注射液5% (100mL/瓶) :1瓶 Day8 Day1 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/g/m Day8 Day1 パ°ロ°セト°点滴静注バ°ッ° 0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :70mg/g/m Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 イミフヅ°点滴静注液500mg:1500mg Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液PL「フー」(500mL/瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1
41	Durvalumab+GC(40≤CCr<60)	ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。イミフヅ°は体重30kg以下の場合20mg/kg。4コース目まで。	10	11	パ°ロ°セト°点滴静注バ°ッ° 0.75mg/50mL「タレウ」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 Day8 ブドウ糖注射液5% (100mL/瓶) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/g/m Day1 Day8 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :35mg/g/m Day1 Day8 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 Day8 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 イミフヅ°点滴静注液500mg:1500mg Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day8 Day9 Day10 Day2 Day3 生理食塩液PL「フー」(500mL/瓶):1瓶 Day8 Day9 Day10 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day8 Day1
42	Durvalumab (術後補助)	イミフヅ°は体重30kg以下の場合20mg/kg。	1	27	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 イミフヅ°点滴静注液500mg:1500mg Day1
30-2	Nivolumab (q4w)	術後補助療法、投与期間は12ヵ月までとする。	1	27	生食 (1000mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(500mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :2瓶 Day1
16-1	GEM+CBDC (day1)	CBDCの目標AUCは3~5で投与 (イミフヅ°はAUC5で設定) 腎機能障害のある患者のみ投与可。ア°レ°タトは主治医判断	8	13	生食 (1000mL) :1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%1000mL) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/g/m Day1 Day8 グラニセト°点滴静注液バ°ッ° 1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/g/A Day1

18-1	DOC		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コブ」 (規格なし) :70mg/m ² Day1
24-1	Pembrolizumab (q3w)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg (100mg/4mL) :200mg Day1
30-1	Nivolumab (q2w)	術後補助療法、投与期間は12か月までとする。	1	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1
16-2	GEM + CBDCA (day2)	CBDCAの目標AUCは3~5で投与 (レシメはAUC5で設定) 腎機能障害のある患者のみ投与可。アプロタクトは主治医判断	8	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day2 ブドウ糖注射液 (5% 100mL) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m ² Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 デキサート注射液6.6mg (リ酸イソル8mg相当) :1瓶 Day2 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day2 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day2
18-2	DOC (DEXあり)		1	20	生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸イソル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コブ」 (規格なし) :70mg/m ² Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
24-2	Pembrolizumab (q6w)		1	41	生食 (100mL) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg (100mg/4mL) :400mg Day1