

レジメン一覧				2026/02/24 時点	
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
24	TC (PTX+ CBDCA)	ルット確保時、ビタミン5錠内服。アプレタクト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	1	20	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ネビラ」(規格なし) :180mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1
25	Weekly TC (PTX+ CBDCA)	ルット確保時、ビタミン5錠内服。デキサートは1回目6.6mg, 副作用なければ2回目以降3.3mgに減量。	15	13	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食 (1000mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ネビラ」(規格なし) :80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 Day8 Day15
26	DOC		1	27	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ネビラ」(規格なし) :70mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
28	Durvalumab + TC (PTX+ CBDCA)	前投薬時、ビタミン5錠内服。アプレタクト併用。4~6コース実施後、Durvalumab±Olaparib(維持療法)へ移行	1	20	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ネビラ」(規格なし) :175mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生理食塩液PL「アール」(100mL/瓶):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注液 (規格なし) :1120mg Day1
29	Durvalumab + Olaparib (維持療法)	体重30kg以下の場合、イミフィンジの投与量は20mg/kgで計算する。リソ酸エステルは600mg/dayを分2でday1~28経口投与。	1	27	生理食塩液PL「アール」(100mL/瓶):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注液 (規格なし) :1500mg Day1

53	DP (DOC+CDDP) (ショートハイドレーション)	ア°ル°タト (day1: 125mg, day2,3: 80mg) 併用。 食事等通常摂取 + 1000mL/dayの追加経口補給の推奨 (day1~3)	1	20	生食 (100mL瓶):1瓶 Day1 パ°ロ°セト°ン点滴静注バ°ッグ° 0.75mg/50mL「タイ初」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ°酸イ°ステ°ル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リ°酸イ°ステ°ル2mg) (0.5mL管):2管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし):60mg/g/m Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニコ°」 (規格なし):70mg/g/m Day1 ソルデム1輸液 (500mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管):10m L Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ°」 (10mL):1キット Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋):200m L Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
54.1	Pembrolizumab+ Lenvatinib (q3w)	Lenvatinibは1日1回連日経口投与。	1	20	生食 (100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg (100mg/4mL):200mg Day1
54.2	Pembrolizumab+ Lenvatinib (q6w)	Lenvatinibは1日1回連日経口投与。	1	41	生食 (100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg (100mg/4mL):400mg Day1
27-1	AP (DXR+CDDP)	ア°ル°タト (day1: 125mg, day2~3: 80mg) 併用。	3	25	パ°ロ°セト°ン点滴静注バ°ッグ° 0.75mg/50mL「タイ初」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ°酸イ°ステ°ル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リ°酸イ°ステ°ル2mg) (0.5mL管):2管 Day1 生食 (100mL):1瓶 Day1 ドキシソルビシン塩酸塩注射用 (規格なし):60mg/g/m Day1 生食 (500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし):50mg/g/m Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管):10m L Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋):1袋 Day1
27-2	AP (DXR+CDDP) (ショートハイドレーション)	ア°ル°タト (day1: 125mg, day2,3: 80mg) 併用。 食事等通常摂取 + 1000mL/dayの追加経口補給の推奨 (day1~3)	1	27	生食 (100mL瓶):1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注バ°ッグ° 1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ°酸イ°ステ°ル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リ°酸イ°ステ°ル2mg) (0.5mL管):2管 Day1 ドキシソルビシン塩酸塩注射用 (規格なし):60mg/g/m Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管):10m L Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋):200m L Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし):50mg/g/m Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1

34	GEM + DOC		8	13	<p>グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8  ブドウ糖注射液 (5% 100mL) :1瓶 Day1 Day8  ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8  大塚生食注(250mL):1袋 Day8  ドセタキセル点滴静注「ニコ」 (規格なし) :80mg/m<sup>2</sup> Day8</p>
39	IFM		5	23	<p>生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  メイロン (7% 20mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  ウロミデキサン注 400mg :300mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  イホマイド1g (注射用):1.5g/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
50	IFM + PTX	<p>ルート確保時, リスタミン5錠内服。アプレタクト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。day4~7フィルカラストラム併用。</p>	3	18	<p>生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3  メイロン (7% 20mL) :1管 Day1 Day2 Day3  グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3  ウロミデキサン注 400mg :300mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3  イホマイド1g (注射用):1.6g/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3  ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day2 Day3  大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1  生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1  パクリタキセル注「ネビラ」 (規格なし) :135mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
28	TC (PTX + CBDCA)	<p>ルート確保時, リスタミン5錠内服。アプレタクト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。</p>	1	20	<p>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1  グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  生食 (500mL) :1瓶 Day1  パクリタキセル注「ネビラ」 (規格なし) :180mg/m<sup>2</sup> Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1</p>

29	Weekly TC (PTX+CBDCA)	ルート確保時、ビタミン5錠内服。デキサートは1回目6.6mg、副作用なければ2回目以降3.3mgに減量。	15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15</p> <p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15</p> <p>バクタキセル注「ルビール」(規格なし) :80mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15</p> <p>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15</p> <p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day8 Day15</p> <p>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 Day8 Day15</p>
30	Weekly CPT-11		15	13	<p>パロセトロン点滴静注バグ0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1 Day8 Day15</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>イリリテカン塩酸塩点滴静注液「トール」(規格なし) :100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15</p> <p>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15</p>
31	CPT-11+MMC	マイトマイシン注用10mgの緊急採用願いが必要	15	13	<p>パロセトロン点滴静注バグ0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1 Day8 Day15</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>生食 (200mL) :1管 Day1</p> <p>マイトマイシン注用10mg :10mg/m<sup>2</sup> Day1</p> <p>生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>イリリテカン塩酸塩点滴静注液「トール」(規格なし) :100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15</p> <p>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15</p>
36	CBDCA+RT		1	6	<p>パロセトロン点滴静注バグ0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1</p> <p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1</p> <p>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1</p> <p>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1</p>
45	NDP+RT	アプロピカタ (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	1	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1</p> <p>生食 (500mL) :1瓶 Day1</p> <p>アクブラ静注用 (規格なし) :30mg/m<sup>2</sup> Day1</p> <p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1</p>
48	CDDP+Topotecan	アプロピカタ (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	3	18	<p>パロセトロン点滴静注バグ0.75mg/50mL「タレク」:1袋 Day1</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3</p> <p>デキサート注射液1.65mg (リシ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1</p> <p>生食 (500mL) :1瓶 Day1</p> <p>シスプラチン点滴静注 (規格なし) :50mg/m<sup>2</sup> Day1</p> <p>ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3</p> <p>硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1</p> <p>20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :1袋 Day1</p> <p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3</p> <p>ハイカムチン注射用1.1mg :0.75mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3</p> <p>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3</p>

49	TC (PTX+CBDCA) +Bevacizumab	ルート確保時、レスタミン5錠内服。アパレタット併用。アバスタンは初回90分、2回目60分、3回目～30分で投与可。	1	20	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リシ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 バクシタキセル注「ルビラ」(規格なし) :175mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生食 (1000mL) :1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1
50	Pembrolizumab+TC (PTX+CBDCA) +Bevacizumab	ルート確保時、レスタミン5錠内服。アパレタット併用。アバスタンは初回90分、2回目60分、3回目～30分で投与可。	1	20	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リシ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 バクシタキセル注「ルビラ」(規格なし) :175mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生理食塩液PL「アウ」(100mL/瓶):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1 生食 (1000mL) :1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1
52	Pembrolizumab±Bevacizumab	アバスタチンの投与時間は30分まで短縮可。	1	20	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 生理食塩液PL「アウ」(100mL/瓶):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1 生食 (1000mL) :1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1
56	Cemiplimab		1	20	生食 (1000mL) :1瓶 Day1 リブタヨ点滴静注350mg (7mL/瓶) :350mg Day1
61	Tisotumab Vedotin (体重40kg以上)	初回投与開始前までに眼科医による診察を実施する。フルメチドン点眼、アリルエジン点眼、ヒアルロン酸ナトリウム点眼を使用。	1	20	生理食塩液PL「アウ」(100mL/瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 注射用水 (20mL/管) :0.2mL/kg Day1 テブダック点滴静注用40mg/瓶:2mg/kg Day1
62	Tisotumab Vedotin (体重40kg未満)	初回投与開始前までに眼科医による診察を実施する。フルメチドン点眼、アリルエジン点眼、ヒアルロン酸ナトリウム点眼を使用。	1	20	生理食塩液PL「アウ」(100mL/瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 注射用水 (20mL/管) :0.2mL/kg Day1 テブダック点滴静注用40mg/瓶:2mg/kg Day1

33-2	CDDP+RT (ショートハイドレーション)	ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用。 食事等通常摂取 + 1000mL/dayの追加経口補給の推奨 (day1-3)	1	6	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 20%マンニトール注射液「Y D」(300mL袋) :200m L Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :40m g/m Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
46-1	TP (PTX+CDDP) (day 1 のみ)	ルト確保時, リタミン5錠内服。ア°レ°タト併用。	3	18	パ°ロ°レ°ト°点滴静注パ°ック° 0.75mg/50mL「タ林」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ネビ°-ラ」(規格なし) :175m g/m Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :50m g/m Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 20%マンニトール注射液「Y D」(300mL袋) :1袋 Day1
46-2	TP (PTX+CDDP) (ショートハイドレーション)	ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用。 食事等通常摂取 + 1000mL/dayの追加経口補給の推奨 (day1~3)	1	20	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ネビ°-ラ」(規格なし) :175m g/m Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 20%マンニトール注射液「Y D」(300mL袋) :200m L Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :50m g/m Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1
47-1	TP (PTX+CDDP) + Bevacizumab	ルト確保時, リタミン5錠内服。ア°レ°タト併用。ア°ス°は初 回90分, 2回目60分, 3回目~30分で投与可。	3	18	パ°ロ°レ°ト°点滴静注パ°ック° 0.75mg/50mL「タ林」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リノ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ネビ°-ラ」(規格なし) :175m g/m Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :50m g/m Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 20%マンニトール注射液「Y D」(300mL袋) :1袋 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 アバチン点滴静注用(規格なし):15m g/kg Day1

47-2	TP (PTX+CDDP) + Bevacizumab (ショトハイトレーション)	ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用。 食事等通常摂取 + 1000mL/dayの追加経口補給の推奨 (day1~3)	1	20	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ネビ°ー」 (規格なし) :175m g/m Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :50m g/m Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 アバチン点滴静注用(規格なし):15m g/kg Day1
10	TC (PTX+CBDCA)	ルート確保時, リタミン5錠内服。ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	1	20	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ネビ°ー」 (規格なし) :175m g/m Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0m g/A Day1
11	Weekly TC ①(PTX,CBDCA共にWeekly)	ルート確保時, リタミン5錠内服。デキサートは1回目6.6mg, 副 作用なければ2回目以降3.3mgに減量。	15	13	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ネビ°ー」 (規格なし) :80m g/m Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0m g/A Day1 Day8 Day15
12	Weekly TC ②(PTXのみWeekly)	ルート確保時, リタミン5錠内服。ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。デキサートは2回目以降 3.3mgに減量可	15	6	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ネビ°ー」 (規格なし) :80m g/m Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0m g/A Day1

13	Bi-Weekly PTX	ルート確保時、ビタミン5錠内服。デキサートは1回目6.6mg、副作用なければ2回目以降3.3mgに減量。	1	13	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 バクシセル注「ルビラ」(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
14	DOC		1	27	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「ニコ」(規格なし):70mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
16	Weekly CPT-11		15	13	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(500mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト」(規格なし):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15
17	CPT-11 + MMC	マイトマイシン注10mgの緊急採用願いが必要	15	13	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(20mL):1管 Day1 マイトマイシン注10mg:10mg/m <sup>2</sup> Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト」(規格なし):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15
18	CPT-11 + DOC	アロピタト(day8:125mg, day9~10:80mg)併用。	8	20	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 生食(500mL):1瓶 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト」(規格なし):60mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day8 ドセタキセル点滴静注「ニコ」(規格なし):60mg/m <sup>2</sup> Day8
19	Liposomal DXR		1	27	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドキシル注20mg:40mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液(5%100mL):1瓶 Day1

20	CPT-11+CDDP	ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	15	13	パ°レ°点滴静注バ°0.75mg/50mL「タレ」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リ°酸イ°ル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg (リ°酸イ°ル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day8 Day15 イ°リ°テ°カン塩酸塩点滴静注「ト°」 (規格なし) :60m g /m Day1 Day8 Day15 シ°プラチン点滴静注 (規格なし) :60m g /m Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day15 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1
21	DC (DOC+CBDCA)	加°ア°ラチンの投与量 (範囲) は, AUC5~6 (レ°メ°は AUC6で設定)。ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用	1	20	グラニセトン点滴静注液バ°1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ°酸イ°ル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「コ°」 (規格なし) :70m g /m Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0m g /A Day1
22	Liposomal DXR+CBDCA	ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	1	27	グラニセトン点滴静注液バ°1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ°酸イ°ル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドキシル注 2 0 mg:30m g /m Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0m g /A Day1
23	GEM		15	13	グラニセトン点滴静注液バ°1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リ°酸イ°ル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5% 1 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000m g /m Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15
37	Topotecan		5	16	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 グラニセトン点滴静注液バ°1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg (リ°酸イ°ル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用 1 . 1 m g :1.25m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
38	GEM + CBDCA	ア°レ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	8	13	グラニセトン点滴静注液バ°1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リ°酸イ°ル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5% 1 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000m g /m Day1 Day8 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0m g /A Day1

43	TC (PTX+CBDCA) +Bevacizumab	ルート確保時, リタミン5錠内服。アプレタ併用。ベバシズマブは初回90分, 2回目60分, 3回目~30分で投与可。	1	20	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リ酸エステル2mg相当):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ネビラ」(規格なし):175mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ベバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):15mg/kg Day1
44	Bevacizumab維持療法	ベバシズマブの投与時間は30分まで短縮可。	1	20	生食(100mL瓶):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ベバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):15mg/kg Day1
46	Weekly TC (PTX+CBDCA) + Bevacizumab	ルート確保時, リタミン5錠内服。アプレタ併用。デキサートは2回目以降3.3mgに減量可	15	6	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ネビラ」(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 ベバシズマブBS点滴静注用「CTNK」(規格なし):15mg/kg Day1
55	PTX	ルート確保時, リタミン5錠内服。	1	20	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リ酸エステル2mg相当):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ネビラ」(規格なし):210mg/m <sup>2</sup> Day1
10	MTX (筋肉内投与)		5	9	注射用水(20mL管):0.016mL/kg Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 注射用メソトレキセート50mg/瓶:0.4mg/kg Day2 Day3 Day4 Day5 Day1