

レジメ一覧

2026/02/24 時点

コード	レジメ名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報
					薬品名：数量 投与日
10	Rituximab 100mg/body	リツキサブ投与開始30分前に、0.9% NaCl 100mLと0.9% NaCl 5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：100mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：100mg Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1
11	Rituximab 400mg/body	リツキサブ投与開始30分前に、0.9% NaCl 100mLと0.9% NaCl 5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 生食（500mL）：400mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：400mg Day1
12	Rituximab 500mg/body	リツキサブ投与開始30分前に、0.9% NaCl 100mLと0.9% NaCl 5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 生食（500mL）：500mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：500mg Day1
13	Rituximab 600mg/body	リツキサブ投与開始30分前に、0.9% NaCl 100mLと0.9% NaCl 5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 生食（500mL）：500mL Day1 生食（20mL）：40mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：600mg Day1
14	Rituximab 700mg/body	リツキサブ投与開始30分前に、0.9% NaCl 100mLと0.9% NaCl 5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 生食（100mL）：100mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：100mg Day1 生食（500mL）：500mL Day1 生食（20mL）：40mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：600mg Day1
15	Rituximab 800mg/body	リツキサブ投与開始30分前に、0.9% NaCl 100mLと0.9% NaCl 5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：200mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：200mg Day1 生食（500mL）：500mL Day1 生食（20mL）：40mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：600mg Day1
16	CHOP	day1～5にシタマブ100mg/日内服を併用。7日間併用は主治医判断。投与間隔は3週毎。	1	19	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day1 オンコピン注射用 1mg：1.4mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 注射用エンドキサン 500mg：750mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用（規格なし）：50mg/m ² Day1

17	Bi-Weekly CHOP	day1~5に ^ア ド ^レ コ ^ニ 100mg/日内服を併用。 ^ア ド ^レ コ ^ニ 併用は主治医判断。投与間隔は2週毎。G-CSFによる ^ア ド ^レ コ ^ニ 必要	1	12	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オンコピン注射用 1 mg:1.4m g/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン 5 0 0 mg:750m g/m ² Day1 ソルデム3A輸液 (5 0 0 mL):1袋 Day1 生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :50m g/m ² Day1
19	CCD		3	18	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リソ酸イソフル8mg相当) :5瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トウ」 (規格なし) :25m g/m ² Day1 Day2 Day3 生食 (5 0 0 mL) :1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :250m g/m ² Day1
20	CMD		3	18	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リソ酸イソフル8mg相当) :5瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day2 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トウ」 (規格なし) :25m g/m ² Day1 Day2 大塚生食注(250mL):1袋 Day3 ノバントロン注10mg (5mL瓶) :8m g/m ² Day3
21	Bendamustine		2	19	生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 Day2 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 デキサート注射液1.65mg (リソ酸イソフル2mg相当) :2管 Day1 Day2 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 ベンタムスチン塩酸塩点滴静注液 (規格なし) :120m g/m ² Day1 Day2
22	ABVD	主治医判断で ^ア ド ^レ コ ^ニ (day1~3, 15~17) 併用。 ^ア ド ^レ コ ^ニ 併用は緊急採用願ひ要提出。	15	13	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg (リソ酸イソフル8mg相当) :1瓶 Day1 Day15 生食 (1 0 0 mL) :1瓶 Day1 Day15 プレオ注射用 (規格なし) :10m g/m ² Day1 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day15 エクザール注射用 1 0 m g :6m g/m ² Day1 Day15 ドキシソルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :25m g/m ² Day1 Day15 ソルデム3A輸液 (5 0 0 mL):1袋 Day1 Day15 生食 (5 0 0 mL) :1瓶 Day1 Day15 注射用水 (20mL管) :37.5m L/m ² Day1 ダカルバジン注用 1 0 0 :375m g/m ² Day1 Day15 注射用水 (20mL管) :2管 Day15

23	AMP		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用(規格なし):30mg/g/m Day1 注射用サイメリン50mg:60mg/g/m Day1 水溶性ブレドニン(規格なし):40mg/g/m Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1</p>
24	EPOCH	day1~5の7 ⁰ レドニン(60mg/m2) 経口併用可。	5	16	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day5 Day1 Day2 Day3 Day4 生食(500mL):1瓶 Day5 注射用エンドキサン500mg:750mg/g/m Day5 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 オンコピン注射用1mg:0.4mg/g/m Day1 Day2 Day3 Day4 ドキシルピシン塩酸塩注射用(規格なし):10mg/g/m Day1 Day2 Day3 Day4 イトボシド点滴静注液100mg〔サント〕(5mL瓶):50mg/g/m Day1 Day2 Day3</p>
25	VECP	day2, 3の7 ⁰ レドニンは経口投与。	3	25	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3 注射用フィルデシン(規格なし):2.4mg/g/m Day1 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg〔サント〕(5mL瓶):100mg/g/m Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):250mg/g/m Day1 水溶性ブレドニン50mg:50mg/g Day1</p>
26	VCAP-AMP-VECP	day2~6, 9~13, 18~27にG-CSF投与。day16, 17の7 ⁰ レドニンは経口投与。	17	11	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 オンコピン注射用1mg:1mg/g/m Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用(規格なし):40mg/g/m Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:350mg/g/m Day1 水溶性ブレドニン(規格なし):40mg/g/m Day1 Day8 Day15 ドキシルピシン塩酸塩注射用(規格なし):30mg/g/m Day8 注射用サイメリン50mg:60mg/g/m Day8 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day15 Day16 Day17 注射用フィルデシン(規格なし):2.4mg/g/m Day15 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day15 Day16 Day17 イトボシド点滴静注液100mg〔サント〕(5mL瓶):100mg/g/m Day15 Day16 Day17</p>
27	MPV	塩酸プロカルバジン(100mg/m2/dayを2-3分割)は、MTX投与前日から7日間内服、ただし奇数サイクルのみ	5	8	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 ロイコボリン注3mg(1mL管):15mg/g/m Day2 Day4 Day5 Day3 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 注射用メソトレキセート大量(規格なし):3500mg/g/m Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オンコピン注射用1mg/瓶:1.4mg/g/m Day1</p>

27.1	MPV (010林 [®] リ注なし)	塩酸プロカルバジン (100mg/m ² /dayを2-3分割) は、MTX投与前日から7日間内服、ただし奇数サイクルのみ	1	12	グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 注射用メソトレキセート大量 (規格なし) :3500mg/m ² Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オンコピン注射用1mg/瓶:1.4mg/m ² Day1
27.2	MPV (レボホリナート代替)	塩酸プロカルバジン (100mg/m ² /dayを2-3分割) は、MTX投与前日から7日間内服、ただし奇数サイクルのみ	5	8	グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト」 (規格なし) :12.5mg Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液PL「フ」(20mL/管):5mL Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 注射用メソトレキセート大量 (規格なし) :3500mg/m ² Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オンコピン注射用1mg/瓶:1.4mg/m ² Day1
48	GDP		8	13	グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 Day8 デキサート注射液6.6mg (リソ酸17.8mg相当) :5瓶 Day1 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :25mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m ² Day1 Day8 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3 Day8 デキサート注射液6.6mg (リソ酸17.8mg相当) :1瓶 Day8
49	DeVIC	放射線療法と同時に実施する場合は、2/3量に減量。	3	18	生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リソ酸17.8mg相当) :5瓶 Day1 Day2 Day3 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注400mg :1管 Day1 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 イホマイド1g〔注射用〕:1.5g/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液 (5%500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液100mg〔サンド〕 (ラステット) :100mg/m ² Day1 Day2 Day3 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :300mg/m ² Day1
50	MINE		3	18	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 ノバントロン注10mg (5mL瓶) :8mg/m ² Day1 グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注400mg :1管 Day1 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 イホマイド1g〔注射用〕:1.33g/m ² Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液5% (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液100mg〔サンド〕 (ラステット) :65mg/m ² Day1 Day2 Day3

51	THP-COP	プレドニ30mg/m ² /日を3~5日間経口投与。	1	19	大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オンコピン注射用 1mg:1m g/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5% 100mL) :1瓶 Day1 注射用テラルピシン (規格なし) :30m g/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン 500mg:500m g/m ² Day1
52	Gemcitabine		15	13	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000m g/m ² Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day8 Day15
53	CHASE	エンドキサン開始6時間前~終了24時間後までメロンを含む80mL/時以上の補液が必要。	3	18	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :5瓶 Day1 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 注射用エンドキサン 500mg:1200m g/m ² Day1 イトボシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット) :100m g/m ² Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL):1袋 Day2 Day3 シタラピン点滴静注液「NIG」(規格なし) :2000m g/m ² Day2 Day3
54	DHAP		4	17	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液6.6mg (リノ酸エステル8mg相当) :5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :25m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注(250mL):1袋 Day2 シタラピン点滴静注液「NIG」(規格なし) :2000m g/m ² Day2 イトボシド点滴静注液100mg「武田テバ」:1瓶 Day2
55	ESHAP		5	23	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソル・メドロール静注用500mg (溶解液8mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :25m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 イトボシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット) :40m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注(250mL):1袋 Day5 シタラピン点滴静注液「NIG」(規格なし) :2000m g/m ² Day5
56	MTX大量		5	9	生食 (500mL) :1瓶 Day1 注射用メソトレキセート大量 (規格なし) :3500m g/m ² Day1 ロイコボリン注 3mg (1mL) :15m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1

56.1	MTX大量（0.1g/kg以上）		1	13	生食（500mL）：1瓶 Day1 注射用メソトレキセート大量（規格なし）：3500mg/m ² Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1
58	CPT-11	1週毎に2～3回繰り返し、少なくとも2週間休薬する。	3	4	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 Day2 Day3 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト」(規格なし)：40mg/m ² Day1 Day2 Day3
59	M-FEPA	MTXの投与に際して、Ccr 60mL/min以上であることを確認。	3	4	ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3 メイロン（7%20mL）：1管 Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 生食（20mL）：1管 Day1 注射用メソトレキセート50mg：100mg/m ² Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 注射用メソトレキセート50mg：300mg/m ² Day1 ロイコボリン注3mg（1mL）：5管 Day2 Day3
60	大量Ara-C（PCNSL）	2コースの地固め療法として行う。	2	26	生食（500mL瓶）：1瓶 Day2 Day1 シタラピン点滴静注液「NIG」（規格なし）：3000mg/m ² Day2 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day2 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg）（2mL管）：1瓶 Day1 Day2
64	Pralatrexate	投与10日以上前から葉酸 1.0～1.25mg 内服、VB12 1mg 筋注。週1回投与を6週連続で行い、7週目は休薬する。	15	6	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day1 Day8 Day15 ジフォルタ注射液20mg（1mL瓶）：30mg/m ² Day1 Day8 Day15
66.1	Obinutuzumab + Bendamustine（初回）	カザリバ 投与開始30分前に、加ナル500mg2錠とメトキシミドリン10mg5錠内服。6コース終了後、維持療法を行う。	15	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 Day3 Day2 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用40mg（溶解液1mL）：2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL)：1袋 Day8 Day15 ガザイバ点滴静注1000mg（1000mg/40mL）：1瓶 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day3 Day2 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）：2管 Day3 Day2 大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day3 Day2 ベンタムスチン塩酸塩点滴静注液（規格なし）：90mg/m ² Day3 Day2
66.2	Obinutuzumab + Bendamustine（2回目以降）	カザリバ 投与開始30分前に、加ナル500mg2錠とメトキシミドリン10mg5錠内服。6コース終了後、維持療法を行う。	3	25	生食（100mL）：1瓶 Day1 Day3 Day2 ソル・メドロール静注用40mg（溶解液1mL）：2瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day3 Day2 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）：2管 Day3 Day2 大塚生食注(50mL/袋)：1袋 Day3 Day2 ベンタムスチン塩酸塩点滴静注液（規格なし）：90mg/m ² Day3 Day2 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 ガザイバ点滴静注1000mg（1000mg/40mL）：1瓶 Day1

67.1	Obinutuzumab + Bendamustine (初回、day1同日)	カザリバ 投与開始30分前に、加ナル500mg2錠とビタミン10mg5錠内服。6コース終了後、維持療法を行う。	15	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day15 ソル・メドロール静注用40mg (溶解液1mL) :2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day8 Day15 ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg/40mL) :1瓶 Day8 Day15 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL[HK]:1袋 Day2 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day2 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day2 Day1 ハンタムスリン塩酸塩点滴静注液 (規格なし) :90mg/ml Day2 Day1
67.2	Obinutuzumab + Bendamustine (2回目以降、day1同日)	カザリバ 投与開始30分前に、加ナル500mg2錠とビタミン10mg5錠内服。6コース終了後、維持療法を行う。	2	26	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 ソル・メドロール静注用40mg (溶解液1mL) :2瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg/40mL) :1瓶 Day1 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL[HK]:1袋 Day2 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day2 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day2 Day1 ハンタムスリン塩酸塩点滴静注液 (規格なし) :90mg/ml Day2 Day1
68	Obinutuzumab (維持)	カザリバ 投与開始30分前に、加ナル500mg2錠とビタミン10mg5錠内服。維持療法は2ヶ月毎に2年間行う。	1	55	生食 (100mL) :1瓶 Day1 ソル・メドロール静注用40mg (溶解液1mL) :2瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg/40mL) :1瓶 Day1
86	Romidepsin	アプロビクタ併用。	15	13	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL[HK]:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液PL「ア」(500mL/瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 イストタックス点滴静注用10mg/瓶:14mg/ml Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15
90	Obinutuzumab+CHOP (初回)	カザリバ 投与開始30分前に、加ナル500mg2錠とビタミン10mg5錠内服。day2~6にアプロビクタ100mg/日内服を併用。	15	6	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL[HK]:1袋 Day2 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day2 Day8 Day15 オンコピン注射用 1mg:1.4mg/ml Day2 大塚生食注(250mL):1袋 Day2 注射用エンドキサン 500mg:750mg/ml Day2 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day2 生食 (100mL) :1瓶 Day2 ドキシリビシン塩酸塩注射用 (規格なし) :50mg/ml Day2 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day8 Day15 ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg/40mL) :1瓶 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day8 Day15 生理食塩液PL「ア」(100mL/瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15

91	Obinutuzumab+CHOP (2~6回-回目)	カザリバ 投与開始30分前に、加ナル500mg2錠とレスタミン10mg5錠内服。day2~6にプロトニ100mg/日内服を併用。	2	19	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day2 Day1 オンコピン注射用 1mg:1.4mg/m ² Day2 大塚生食注(250mL):1袋 Day2 注射用エンドキサン 500mg:750mg/m ² Day2 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day2 生食 (100mL) :1瓶 Day2 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :50mg/m ² Day2 生理食塩液PL「ア」(100mL/瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg/40mL) :1瓶 Day1
92	Obinutuzumab (7~8回-回目)	カザリバ 投与開始30分前に、加ナル500mg2錠とレスタミン10mg5錠内服。	1	20	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg/40mL) :1瓶 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1
57-1	Brentuximab Vedotin (<50mg)	アドセトリスの投与量によってレジメンを選択する。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.36mL/kg Day1 アドセトリス点滴静注用50mg:1.8mg/kg Day1
57-2	Brentuximab Vedotin (≥50mg)	アドセトリスの投与量によってレジメンを選択する。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 注射用水 (20mL管) :0.36mL/kg Day1 アドセトリス点滴静注用50mg:1.8mg/kg Day1
79-1	BV + AVd (BV < 50mg)	アドレタントは主治医判断。最大6コース。アドセトリスの投与量によってレジメン選択。ガザイバは緊急採用願ひ要提出	15	13	ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day15 エクザール注射用 10mg:6mg/m ² Day1 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day15 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :25mg/m ² Day1 Day15 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day15 注射用水 (20mL管) :3管 Day1 Day15 タカルバジン注用 100:250mg/m ² Day1 Day15 注射用水 (20mL管) :0.24mL/kg Day1 Day15 アドセトリス点滴静注用50mg/瓶:1.2mg/kg Day1 Day15 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day15

79-2	BV + AVd (BV ≥ 50mg)	アプロタクトは主治医判断。最大6コース。アトロシスの投与量によってレジメン選択。タカバシンは緊急採用願ひ要提出	15	13	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day15</p> <p>グラセトロン点滴静注液(バッグ)1mg/50mL[HK]:1袋 Day1 Day15</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day15</p> <p>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day15</p> <p>エクザール注射用10mg:6mg/m² Day1 Day15</p> <p>生食(100mL):1瓶 Day1 Day15</p> <p>ドキソルビシン塩酸塩注射用(規格なし):25mg/m² Day1 Day15</p> <p>生食(500mL):1瓶 Day1 Day15</p> <p>注射用水(20mL管):3管 Day1 Day15</p> <p>タカルバシン注射用100:250mg/m² Day1 Day15</p> <p>生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day15</p> <p>注射用水(20mL管):0.24mL/kg Day1 Day15</p> <p>アドセトリス点滴静注用50mg/瓶:1.2mg/kg Day1 Day15</p>
83-1	BV + CHP (BV < 50mg)	day1~5にアプロタクト100mg/日内服を併用。アプロタクト併用は主治医判断。アトロシスの投与量によってレジメンを選択。	1	20	<p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL[タレチ]:1袋 Day1</p> <p>生食(100mL):1瓶 Day1</p> <p>ドキソルビシン塩酸塩注射用(規格なし):50mg/m² Day1</p> <p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1</p> <p>注射用エンドキサン500mg:750mg/m² Day1</p> <p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1</p> <p>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1</p> <p>注射用水(20mL管):0.36mL/kg Day1</p> <p>アドセトリス点滴静注用50mg/瓶:1.8mg/kg Day1</p>
83-2	BV + CHP (BV ≥ 50mg)	day1~5にアプロタクト100mg/日内服を併用。アプロタクト併用は主治医判断。アトロシスの投与量によってレジメンを選択。	1	20	<p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL[タレチ]:1袋 Day1</p> <p>生食(100mL):1瓶 Day1</p> <p>ドキソルビシン塩酸塩注射用(規格なし):50mg/m² Day1</p> <p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1</p> <p>注射用エンドキサン500mg:750mg/m² Day1</p> <p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1</p> <p>生食(100mL瓶):1瓶 Day1</p> <p>注射用水(20mL管):0.36mL/kg Day1</p> <p>アドセトリス点滴静注用50mg/瓶:1.8mg/kg Day1</p>
84-1	Polatuzumab Vedotin+Bendamustine (Pola < 75mg)	day1:リツチアブ投与, day2:ホラヒド-は忍容性よければ、2回目以降は30分まで短縮可。	2	19	<p>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2</p> <p>ハンタムスチン塩酸塩点滴静注液(規格なし):90mg/m² Day1 Day2</p> <p>生食(100mL瓶):1瓶 Day2</p> <p>グラセトロン点滴静注液(バッグ)1mg/50mL[HK]:1袋 Day2 Day1</p> <p>デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当):2管 Day2 Day1</p> <p>生食(100mL):1瓶 Day1</p> <p>注射用水(20mL管):0.09mL/kg Day1</p> <p>ポライビー点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day1</p>

84-2	Polatuzumab Vedotin+Bendamustine (Pola \geq 75mg)	day1: リツキサブ投与, day2: ホライビ-は忍容性よければ、2回目以降は30分まで短縮可。	2	19	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 ペンタムスリン塩酸塩点滴静注液(規格なし):90mg/m ² Day1 Day2 生食(100mL瓶):1瓶 Day2 Day1 グラネセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL[HK]:1袋 Day2 Day1 デキサート注射液1.65mg(リソ酸エステル2mg相当):2管 Day2 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 注射用水(20mL管):0.09mL/kg Day1 ポライビ-点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day1
85-1	Pola+CHP (Pola < 75mg)	day1~5にアプレニン100mg/日内服を併用。アプレニント併用は主治医判断。ホライビ-の投与量によってレジメンを選択。	1	20	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL[タイチ]:1袋 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキシリピジン塩酸塩注射液(規格なし):50mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:750mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.09mL/kg Day1 ポライビ-点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day1
85-2	Pola+CHP (Pola \geq 75mg)	day1~5にアプレニン100mg/日内服を併用。アプレニント併用は主治医判断。ホライビ-の投与量によってレジメンを選択。	1	20	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL[タイチ]:1袋 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキシリピジン塩酸塩注射液(規格なし):50mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:750mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 注射用水(20mL管):0.09mL/kg Day1 ポライビ-点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day1
99	PolaBR (R 700mg, Pola \geq 75mg)	リツキサブ投与開始30分前にロキソプロフェンと和ハチン内服、ホライビ-は忍容性よければ2回目以降は30分まで短縮可。	2	19	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 ペンタムスリン塩酸塩点滴静注液(規格なし):90mg/m ² Day1 Day2 生食(100mL瓶):1瓶 Day2 Day1 グラネセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL[HK]:1袋 Day2 Day1 デキサート注射液1.65mg(リソ酸エステル2mg相当):2管 Day2 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 注射用水(20mL管):0.09mL/kg Day1 ポライビ-点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day1 生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):90mL Day1 リツキサブBS点滴静注「KHK」(規格なし):100mg Day1 生理食塩液PL「フー」(500mL/瓶):500mL Day1 生理食塩液PL「フー」(20mL/管):40mL Day1 リツキサブBS点滴静注「KHK」(規格なし):600mg Day1

34	ALL-97変法	day1~7のブドニオン (60mg/m ²) は経口投与。タウマインは緊急採用願いを要提出。	22	6	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 生食 (500mL) :1瓶 Day1 注射用エンドキサン 500mg:800mg/m ² Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8 Day15 Day22 ダウノマイシン (20mg) :30mg/m ² Day1 Day2 Day3 オンコピン注射用 1mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
78	Ph+ALL208IMA 寛解導入療法	タウマインは緊急採用願いを要提出。	22	20	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day3 オンコピン注射用 1mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 ダウノマイシン静注用20mg/瓶:60mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 注射用エンドキサン 500mg:1200mg/m ² Day1
80	Ph+ALL208IMA 地固め療法 C1	day1 MTX+Ara-C+DEX 髄注。day4-21 Imatinib 600mg。アプレタト、ステロイド点眼要。60歳以上 : Ara-C 1,000mg/m ²	4	24	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day2 Day3 Day1 シタラピン点滴静注液〔NIG〕 (規格なし) :2000mg/m ² Day2 Day3 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 ソル・メドロール静注用40mg (溶解液1mL) :50mg Day1 Day2 Day3 ロイコポリン注3mg (1mL管) :15mg Day3 Day4 Day2 注射用メソトレキセート大量 (規格なし) :900mg/m ² Day1 注射用メソトレキセート大量 (規格なし) :100mg/m ² Day1
80.1	Ph+ALL208IMA 地固め療法 C1 (案)	day1 MTX+Ara-C+DEX 髄注。day4-21 Imatinib 600mg。アプレタト、ステロイド点眼要。60歳以上 : Ara-C 1,000mg/m ²	5	23	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day2 Day3 Day1 シタラピン点滴静注液〔NIG〕 (規格なし) :2000mg/m ² Day2 Day3 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 ソル・メドロール静注用40mg (溶解液1mL) :50mg Day1 Day2 Day3 ロイコポリン注3mg (1mL管) :15mg Day3 Day4 Day2 Day5 メソトレキセート点滴静注液200mg (8mL瓶) :900mg/m ² Day1 メソトレキセート点滴静注液200mg (8mL瓶) :100mg/m ² Day1
81	Ph+ALL208IMA 地固め療法 C2	タウマインは緊急採用願いを要提出。	1	27	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オンコピン注射用 1mg:1.3mg/m ² Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 ダウノマイシン静注用20mg/瓶:60mg/m ² Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 注射用エンドキサン 500mg:1200mg/m ² Day1
82	Ph+ALL208IMA 維持療法	day1-5 PSL 60mg/m ² 、day1-28 Imatinib 600mg。寛解到達後2年目まで4週ごとに継続する。	1	27	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 オンコピン注射用 1mg:1.3mg/m ² Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1

90	ALL202-O 地固め療法 C1=C4	day1 MTX+DEX 髄注。アロピト点眼要。60歳以上 : Ara-C 1,000mg/m ²	3	0	<p>グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3</p> <p>テルモ生食(500mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3</p> <p>シタラピン点滴静注液「NIG」(規格なし):2000mg/m² Day1 Day2 Day3</p> <p>生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管):5瓶 Day1 Day2 Day3</p> <p>生理食塩液PL「フー」(500mL/瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3</p> <p>イトボシド点滴静注液100mg「サト」(5mL瓶):100mg/m² Day1 Day2 Day3</p>
92	ALL202-O 地固め療法 C3	day1, 29 MTX+AraC+DEX 髄注。day1-8, 15-22 DEX併用。day29-42 ロケリ散併用(緊急採用願ひ必要)。	40	2	<p>グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day29</p> <p>大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15</p> <p>オンコピン注射用1mg/瓶:1.3mg/m² Day1 Day8 Day15</p> <p>生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40</p> <p>ドキシルピシン塩酸塩注射用(規格なし):30mg/m² Day1 Day8 Day15</p> <p>生理食塩液PL「フー」(500mL/瓶):1瓶 Day29</p> <p>注射用エンドキサン500mg/瓶:1000mg/m² Day29</p> <p>キロサイド注20mg (1mL管):75mg/m² Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 Day36 Day37 Day38 Day39 Day40</p>
28	DA (寛解導入療法)	アロピト (day1:125mg, day2~3:80mg) 併用。ダウマイシンは緊急採用願ひを要提出。	7	21	<p>グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p> <p>生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>ダウマイシン(20mg):50mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p> <p>キロサイド注(規格なし):100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>
29	MA (地固め療法)		5	23	<p>グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p> <p>生食(500mL):1瓶 Day4 Day5 Day1 Day2 Day3</p> <p>キロサイド注(規格なし):200mg/m² Day4 Day5 Day1 Day2 Day3</p> <p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3</p> <p>ノバントロン注10mg (5mL瓶):7mg/m² Day1 Day2 Day3</p>
30	DA (地固め療法)	アロピト (day1:125mg, day2~3:80mg) 併用。ダウマイシンは緊急採用願ひを要提出。	5	23	<p>グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p> <p>生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3</p> <p>ダウマイシン(20mg):50mg/m² Day1 Day2 Day3</p> <p>生食(500mL):1瓶 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p> <p>キロサイド注(規格なし):200mg/m² Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p>

31	AA (地固め療法)		5	23	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注 (規格なし):200mg/g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アクラシノン注射用20mg:20mg/g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
32	AVVV (地固め療法)	ア°比°タト (day1:125mg, day2~3:80mg) 併用。	10	18	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注 (規格なし):200mg/g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注射液5% (500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イトボシド点滴静注液100mg〔サンド〕 (ラスト):100mg/g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (20mL):1管 Day8 Day10 オンコピン注射用1mg:0.8mg/g/m² Day8</p>
33	CAG	day1~28にG-CSF投与。65歳以上はアクラシノン10mg/m ² 。	14	14	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 生食 (500mL):1瓶 Day1 Day5 Day6 Day7 Day8 Day10 Day11 Day9 Day12 Day13 Day14 Day2 Day3 Day4 キロサイド注 (規格なし):20mg/g/m² Day1 Day5 Day6 Day7 Day8 Day10 Day11 Day9 Day12 Day13 Day14 Day2 Day3 Day4 生食 (100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 アクラシノン注射用20mg:14mg/g/m² Day1 Day2 Day3 Day4</p>
34	ATO (三酸化二ヒ素)	導入療法の合計投与回数は60回を超えないこと。寛解後療法は5週間で計25回投与すること。	7	0	<p>大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 トリセノックス点滴静注12mg:0.15mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>
65	IDR+AraC	ア°比°タト (day1:125mg, day2~3:80mg) 併用。	5	16	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 生食 (100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 注射用水 (20mL管):1管 Day1 Day2 Day3 イダマイシン静注用5mg/瓶:12mg/g/m² Day1 Day2 Day3 生食 (500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注 (規格なし):140mg/g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
100	Gemtuzumab Ozogamicin	投与回数は、少なくとも14日間の投与間隔を置いて、2回とする。	1	13	<p>生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 注射用水 (20mL管):9mL/g/m² Day1 マイロターグ点滴静注用5mg/瓶:9mg/g/m² Day1</p>

110	Vyxeos (寛解導入療法)	寛解導入療法は最大2コースまで。77°比°カト併用。	5	9	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day3 Day5 デキサート注射液6.6mg (リ酸1778mg) (2mL管):1瓶 Day1 Day3 Day5 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day3 Day5 生理食塩液PL「77-」(500mL/瓶):1瓶 Day1 Day3 Day5 注射用水 (20mL/管):19m L/m Day1 Day3 Day5 ピキセオス配合静注用:100単位/m Day1 Day3 Day5
111	Vyxeos (地固め療法)	最後の寛解導入療法から5~8週間後に開始。最大2コースまで。77°比°カト併用。	3	32	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day3 デキサート注射液6.6mg (リ酸1778mg) (2mL管):1瓶 Day1 Day3 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day3 生理食塩液PL「77-」(500mL/瓶):1瓶 Day1 Day3 注射用水 (20mL/管):12.35m L/m Day1 Day3 ピキセオス配合静注用:65単位/m Day1 Day3
38	(SC) Azacitidine (day1~7)		7	21	注射用水 (20mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 アザシチジン注射用〔NK〕 (規格なし):75mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
39	(SC) Azacitidine (day1~5, 8~9)		9	19	注射用水 (20mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 アザシチジン注射用〔NK〕 (規格なし):75mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9
40	(DIV) Azacitidine (day1~7)		7	21	生食 (20mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 注射用水 (20mL管):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 アザシチジン注射用〔NK〕 (規格なし):75mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
41	(DIV) Azacitidine (day1~5, 8~9)		9	19	生食 (20mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 注射用水 (20mL管):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 アザシチジン注射用〔NK〕 (規格なし):75mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9
42	Mogamulizumab	必要により解熱鎮痛剤 (アトアミノフェン等) の前投与を行う。週1回 (化学療法併用の場合, 2週に1回), 8回投与。	1	0	生食 (100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ポテリゾ点静注20mg:1mg/kg Day1 生食 (100mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リ酸1778mg) (2mL管):1瓶 Day1 ポララミン注5mg (1mL管):1管 Day1

45	VCAP	day2~6にG-CSF投与。	1	6	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食 (100mL):1瓶 Day1 オンコピン注射用 1mg:1mg/g/mi Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (規格なし):40mg/g/mi Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン 500mg:350mg/g/mi Day1 水溶性ブレドニン (規格なし):40mg/g/mi Day1
46	AMP	day2~6にG-CSF投与。	1	6	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食 (100mL):1瓶 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (規格なし):30mg/g/mi Day1 注射用サイメリン 50mg:60mg/g/mi Day1 水溶性ブレドニン (規格なし):40mg/g/mi Day1 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1
47	VECP	day4~13にG-CSF投与。day2, 3のﾌﾟﾛﾄﾞﾝは経口投与。	3	11	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3 注射用フィルデシン (規格なし):2.4mg/g/mi Day1 ブドウ糖注射液5% (500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液100mg「サンド」(ﾌﾞﾗｯｼﾞ) :100mg/g/mi Day1 Day2 Day3 生食 (500mL):1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし):250mg/g/mi Day1 水溶性ブレドニン (規格なし):40mg/g/mi Day1
47	VECP (フィルデシン1mg)	day4~13にG-CSF投与。day2, 3のﾌﾟﾛﾄﾞﾝは経口投与。	3	11	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day2 Day3 注射用フィルデシン1mg/瓶:2.4mg/g/mi Day1 ブドウ糖注射液5% (500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液100mg「サンド」(ﾌﾞﾗｯｼﾞ) :100mg/g/mi Day1 Day2 Day3 生食 (500mL):1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし):250mg/g/mi Day1 水溶性ブレドニン (規格なし):40mg/g/mi Day1
60	CDDP (10mg) +CPT-11 (20mg)		3	1	大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ﾄｰｸ」:20mg/g Day1 Day2 Day3 生食 (500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」20mL:10mg/g Day1 Day2 Day3 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食 (100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3
63	CDDP (20mg) +CPT-11 (40mg)		3	1	大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ﾄｰｸ」:40mg/g Day1 Day2 Day3 生食 (500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」20mL:20mg/g Day1 Day2 Day3 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食 (100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3

85	(SC) DC y BorD (1~2コース)	前投薬はDEX (20mg/day)、アトアミノフェン、シフェンブトラム。CY 300mg/m ² (max500mg)も併用。(DEXは翌日も20mg/day)	22	6	生食 (20 mL) :1管 Day1 Day8 Day15 Day22 ヘルケイド注射用3mg/瓶:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 ダラキューロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22
86	(SC) DC y BorD (3~6コース)	前投薬はDEX (20mg/day)、アトアミノフェン、シフェンブトラム。CY 300mg/m ² (max500mg)も併用。(DEXは翌日も20mg/day)	22	6	ダラキューロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1 Day15 生食 (20 mL) :1管 Day1 Day8 Day15 Day22 ヘルケイド注射用3mg/瓶:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
87	(SC) DC y BorD (7~24コース)	前投薬はDEX (20mg/day)、アトアミノフェン、シフェンブトラム。	1	27	ダラキューロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1
43	(SC) Bortezomib±Dexamethasone	day2, 5, 9, 12はデキサメタゾン10mg/body経口投与。	11	10	生食 (100 mL) :1瓶 Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液1.65mg (リシ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 Day4 Day8 Day11 生食 (20 mL) :1管 Day1 Day4 Day8 Day11 ボルテゾミブ注射用 (規格なし) :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11
53	(SC) Bortezomib (維持) (トロー)	副腎皮質ステロイド (プレドニソン等) を適宜併用。	22	13	生食 (20 mL) :1管 Day1 Day8 Day15 Day22 ボルテゾミブ注射用 (規格なし) :1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
62	Elotuzumab (3コース目以降)	カサネール500mg 1錠, イタミン10mg 3錠内服。プレドニソン、プレドニソン併用。	15	13	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day15 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day15 大塚生食注(250mL):230mL Day15 注射用水 (20mL管) :0.4mL/kg Day15 エムプリシディ点滴静注用 (規格なし) :10mg/kg Day15
71	EPd (1、2コース目)	カサネール500mg 1錠, イタミン10mg 3錠内服。プレドニソン、プレドニソン併用。	22	6	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 Day22 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 大塚生食注(250mL):230mL Day8 Day15 Day22 注射用水 (20mL管) :0.4mL/kg Day8 Day15 Day22 エムプリシディ点滴静注用 (規格なし) :10mg/kg Day8 Day15 Day22
72	EPd (3コース目以降)	カサネール500mg 1錠, イタミン10mg 3錠内服。プレドニソン、プレドニソン併用。	1	27	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.8mL/kg Day1 エムプリシディ点滴静注用 (規格なし) :20mg/kg Day1

91	IsaPd療法 (1J-入目)	前投薬はDEX40mg、加ナール500mg2錠、メトキシミン10mg5錠。ホドマドミト(day1~21)も併用。(75歳以上ではDEX20mg)	22	6	大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day22 Day1 Day8 Day15 サークリサ点滴静注(規格なし):10m g/kg Day22 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day15 Day22 Day8 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day15 Day22 Day8
92	IsaPd療法 (2J-入目以降)	前投薬はDEX40mg(75歳以上は20mg),加ナール1000mg,メトキシミン50mg。ホドマドミト(day1~21)も併用。DEXはday8,22も。	15	13	大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day15 サークリサ点滴静注(規格なし):10m g/kg Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day15
97	Cd (1J-入目)	前投薬はDEX (40mg/day) 。DEXはday22も40mg/day(9コースまで)。	15	13	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液5% (100mL瓶) :1瓶 Day15 Day8 注射用水 (20mL管) :35m L/m Day15 Day8 カiproリス点滴静注用 (規格なし) :70m g/m Day15 Day8 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 注射用水 (20mL管) :10m L/m Day1 カiproリス点滴静注用 (規格なし) :20m g/m Day1
98	Cd (2J-入目~)	前投薬はDEX (40mg/day) 。DEXはday22も40mg/day(9コースまで)。	15	13	大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液5% (100mL瓶) :1瓶 Day8 Day15 注射用水 (20mL管) :35m L/m Day8 Day15 カiproリス点滴静注用 (規格なし) :70m g/m Day8 Day15 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15
112	IsaCd療法 (1J-入目)	前投薬は加ナール500mg2錠。点滴がないday23はDEX20mgの処方が必要。	22	6	大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day22 Day1 Day8 Day15 サークリサ点滴静注(規格なし):10m g/kg Day22 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day22 Day9 Day16 Day15 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day16 Day15 Day22 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 Day2 Day8 Day9 Day16 Day15 Day22 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液PL「フー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day9 Day16 ブドウ糖注射液5% (100mL/瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day8 Day9 Day16 Day15 注射用水 (20mL/管) :10m L/m Day1 Day2 カiproリス点滴静注用 (規格なし) :20m g/m Day1 Day2 注射用水 (20mL/管) :28m L/m Day8 Day9 Day16 Day15
69	Dld (1,2J-入目)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナール500mg 2錠、モテカスト10mg 1錠内服。レドマドミト 3週投与、1週休薬。	22	6	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :5瓶 Day8 Day15 Day22 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day8 Day15 Day22 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g/kg Day8 Day15 Day22 テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day1

70	DLD (3~6コース目)	day1,15 加ナール500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠内服。 レゾラミド 3週投与、1週休薬。day8,22 レゾラミド40mg内服。	15	13	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day15 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :5瓶 Day15 ボララミン注5mg (1mL管) :1管 Day15 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day15 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g/kg Day15
71	DLD (7コース目~)	day1 加ナール500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠内服。レゾラミド 3週投与、1週休薬。day8,15,22 レゾラミド40mg内服。	1	27	生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g/kg Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :5瓶 Day1 ボララミン注5mg (1mL管) :1管 Day1
72	DMPB (1コース目)	ダラザレックス投与1-3時間前に、加ナール500mg 2T,モンテカスト10mg 1T。day1-4 アルカラン 9mg/m ² ,day2-4 プレドニソン 60mg/m ² 。	36	6	生食 (20mL管) :1管 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 ボルテゾミブ注射用 (規格なし) :1.3m g/m ² Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 ボララミン注5mg (1mL管) :1管 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day29 Day36 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g/kg Day29 Day36 Day8 Day15 Day22 テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day1
73	DMPB (2~9コース目)	ダラザレックス投与1-3時間前に、加ナール500mg 2T,モンテカスト10mg 1T。day1-4 アルカラン 9mg/m ² ,day2-4 プレドニソン 60mg/m ² 。	29	13	生食 (20mL管) :1管 Day8 Day22 Day29 Day1 ボルテゾミブ注射用 (規格なし) :1.3m g/m ² Day8 Day22 Day29 Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day22 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day22 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day22 Day1 ボララミン注5mg (1mL管) :1管 Day22 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day22 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g/kg Day1
74	DMPB (10コース目~)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナール500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠 内服。	1	27	生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g/kg Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 ボララミン注5mg (1mL管) :1管 Day1

75	DBd (1~3コース目)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠 内服。day2, 9 レテックス 20mg 内服。	15	6	生食 (20mL管) :1管 Day8 Day1 ボルテゾミブ注射用 (規格なし) :1.3m g /m Day8 Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg (リシ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day8 Day15 ボラミン注5mg (1mL管) :1管 Day8 Day15 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day8 Day15 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g /kg Day8 Day15 テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day1
76	DBd (4~8コース目)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠 内服。day2, 8, 9 レテックス 20mg 内服。	8	13	生食 (20mL管) :1管 Day8 Day1 ボルテゾミブ注射用 (規格なし) :1.3m g /m Day8 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g /kg Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リシ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 ボラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1
77	DBd (9コース目~)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠 内服。	1	20	生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g /kg Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リシ酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リシ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 ボラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1
88	DPd (1~2コース目)	前投薬はDEX (20mg/day) 、アトアミノフェン、シフエルトラミン。レナリドミド (day1-21) も併用。(DEXは翌日も	22	6	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22□
89	DPd (3~6コース目)	前投薬はDEX (20mg/day) 、アトアミノフェン、シフエルトラミン。レナリドミド (day1-21) も併用。(DEXは翌日も	15	13	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1 Day15□
90	DPd (7~24コース目)	前投薬はDEX (20mg/day) 、アトアミノフェン、シフエルトラミン。レナリドミド (day1-21) も併用。(DEXは翌日も	1	27	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1□
91	DBd (SC、1~3コース目)	前投薬はDEX (20mg/day) 、アトアミノフェン、シフエルトラミンを内服。(day1,8 DEXは翌日も20mg/day)	15	6	生食 (20mL管) :1管 Day1 Day8 ボルテゾミブ注射用 (規格なし) :1.3m g /m Day1 Day8 ダラキユーロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15
92	DBd (SC、4~8コース目)	前投薬はDEX (20mg/day) 、アトアミノフェン、シフエルトラミンを内服。(DEXは翌日も20mg/day)	8	13	生食 (20mL管) :1管 Day1 Day8 ボルテゾミブ注射用 (規格なし) :1.3m g /m Day1 Day8 ダラキユーロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1
93	DBd (SC、9コース目~)	前投薬はDEX (20mg/day) 、アトアミノフェン、シフエルトラミンを内服。	1	27	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1□
94	DLd (1~2コース目)	前投薬はDEX (20mg/day) 、アトアミノフェン、シフエルトラミン。レナリドミド (day1-21) も併用。(DEXは翌日も	22	6	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22□
95	DLd (3~6コース目)	前投薬はDEX (20mg/day) 、アトアミノフェン、シフエルトラミン。レナリドミド (day1-21) も併用。(DEXは翌日も	15	13	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1 Day15□
96	DLd (7コース目~)	前投薬はDEX (20mg/day) 、アトアミノフェン、シフエルトラミン。レナリドミド (day1-21) も併用。(DEXは翌日も	1	27	ダラキユーロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1□

99	DCd (3~6コース目)	前投薬はDEX (20mg/day)、アトアミン650~1000mg、ビタミン25~50mg、モンテカスト10mg (1コースday1のみ) を経口投与	16	12	ダラキューロ配合皮下注 (15mL瓶) :1瓶 Day1 Day15 生理食塩液PL「ア」(100mL/瓶):1瓶 Day15 Day2 Day8 Day9 Day16 大塚生食注(50mL/袋):1袋 Day15 Day2 Day8 Day9 Day16 ブドウ糖注射液5% (100mL/瓶) :1瓶 Day15 Day2 Day8 Day9 Day16 注射用水 (20mL/管) :28m L/m ³ Day15 Day2 Day8 Day9 Day16 カイプロリス点滴静注用 (規格なし) :56m g/m ³ Day15 Day2 Day8 Day9 Day16
----	---------------	--	----	----	---